

הנחיות לגידול מילון "גליה"

מאת צבי קרחי, מינהל המחקר החקלאי
אברהם איילון, המחלקה לירקות, שה"מ, משרד החקלאות



מילוני גליה בנביעות.

איכות הפרי — יש לספק להם תנאי גידול משופרים ביותר.
מחזור זרעים — הכרב הרצוי מילון גליה, כמו כל צמח ממשפחת הדילועיים.

שדות מילונים מהזן "גליה" השתרעו, עוד בשנים קודמות, על עשרות דונמים בכל עונות השנה. הם גדלו בעמק-יזרעאל, בשפלת החוף, בצפון הנגב, בבקעת הירדן, בערבה ובחוף סיני (נביעות), והניבו יבולים טובים של פרי מאיכות משובחת ביותר.

באביב וקיץ 1976 נזרעו מאות דונמים מזן-באביב זה. הפרי השיג תמורה מרובה בשוק מכלוא וגם בחו"ל. בהתאם לדרישת החקלאים המקומי וגם גדולה למדי של זרעי-מכלוא, ומ-הפיקו כמות גדולה שטחים ניכרת ב-1977. סיבה זו צפויה הרחבת שטחים מזן זה לשוקי חוץ גם יצוא כמות גדולה מזן זה לשוקי אירופה, במשך כל האביב והקיץ הבאים. הרבה מגדלים חדשים מצטרפים עתה לחוג מגדלי מי-לון גליה.

עם הזן גליה נפתח עידן הגידול של מילונים מניימכלוא. כדי להשיג מזנים כאלה את מלוא פוטנציאל היבול שהם מסוגלים להניב ואת מירב

הגשמים

שיבשו שדותיך בעשבים
אחרת להשמידם

דוקטלון קטלון (גרמוקסון)

רגלון

באים לעזרתך
לפני הזריעה (ואפילו ביום הזריעה)
אחרי הזריעה (במרם הציץ הגידול)

דוקטלון וגרמוקסון מיצרים ע"י:
I.C.I. Plant
Protection Division

מכתשים

מכתלים כיחיים בט"ח
ייעוץ והדרכה: המחלקה החקלאית ח.ד. 60 באר-שבע




והסתיו זקוקים לאותה הכנה יסודית וקפדנית. כל שכבת בית-השרשים חייבת להיות מנוקת ומאוזנת היטב. כן יש להגיש לצמח את כל חמרי הדרושים, בצורה מרוכזת וחשכונית. לשם כך מבצעים עיבודים מעמיקים לפני העיבוד ומכינים בכל העונות ערוגות מוגבהות. חמרי המזון דהיינו זבלים אורגניים ודשנים כימיים, נותנים בתלם שבמרכז כל ערוגה. אחר עיבודי הקרקע והכנת מצע הזרעים חייבים פני הקרקע להיות ישרים וחלקים, וכל שכבת העיבוד חייבת להיות ללא רגבים גדולים ומפוררת היטב.

זיבול ודישון יכול רב של מילונים מזני מכלוא – משיגים רק באדמה פורייה. אין להסתפק בפוריותה הטבעית של הקרקע. מנות זבל אורגני, 2–4 מ"ק לדונם, בתלם במרכז הערוגה – נתנו תוצאות טובות. הובל חייב להיות מרוקבב וללא גושים. יש להצניעו עמוק (20–15 ס"מ אחר הכיסוי). הימצאות גושי זבל או הצנעה שטחית יגרמו ליקויים בנביטה. על הובל האורגני אל תוך התלם הפתוח, מפורים 50–60 ק"ג סופר פוספט מועשר לדונם ומצניעים יחד עם הובל.

רגיש למכלול מחלות הקרקע. לכן אין לזרוע אותו באותו שדה אלא פעם אחת ב-4–5 שנים. הכרב הרצוי לו: שחת או דגן. אפשר לגדלו גם אחר כותנה, אך שאריות הגידול הקודם חייבות להיות מפורקות לחלוטין. יש להיזהר מאוד משאריות של הרביצידיים מהגידולים הקודמים.

הכנת האדמה הכנות הקרקע למזרעי ראשית האביב (מדצמבר עד פברואר) נעשו לפני החורף. גם מזרעי הקיץ



ערוגות מוגבהות



כרפס אני! ראו נא
כמה יפה עליהם
לא פלא, אם בחשק
אנגלים אותי אוכלים.
ספטוריה לא פגעה בי
ולא קשיוניה
בטקטוריל טיפלו בי-
וזה נפלא היה!

להגנת כרפס עליהם - טקטוריל F-40®


יבואן: אסיא-ריזל. הפצה: אסיא מעברות בע"מ, רח' בבלי 8, תל. 03-459363

השקית-יסוד

בכל עוגות הזריעה חייבים להרטיב את קרקע של 70-80 ס"מ עד לרטיבות של קיבול השדה. יש להקדים השקיה זו ככל האפשר, כדי להמריץ פעילות מרבית של מיקרואורגניזמים על חמרי המזון — להשגת פוריות מרובה מראשית הגידול. עשבי-בר הנובטים אחר השקית-היסוד יושמדו בריסוס בדו-קטלון.

מועדי הזריעה

אלה נקבעים בהתאם לאזורי הגידול. יש אזורים, שבהם תקופת הזריעה מצומצמת למדי. בעונה הקרה אי אפשר לגדל מילון גליה ללא הגנת מנהרות. גובה המנהרה ורחבה תלויים במועד הזריעה ובאורך הדרוש של תקופת הכיסוי. כדי לחסוך בהוצאות במועדי הביניים — אפשר לתמרן



מסורים 50-60 ק"ג ד' גפרת-אמון (זו הצורה היעילה של דשן חנקני), על-פני הערוגה, ומצניעים בתחתית שטחי אסור לתחת עמוק, פן יתגלה הזבל המוצנע בתלם. אחר התיחת הזה יהיו פני הערוגה ישרים וחלקים.

לוח מועדי הזריעה של גליה

ה ח ו ד ש	החודש
דצמבר, ינואר, פברואר, מרס, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר	החודש
-----	החודש
-----	החודש
-----	החודש
-----	החודש

לוח מועדי הקטיפ של גליה (בהתאם לתאריכי הזריעה הנ"ל)

ה ח ו ד ש	החודש
דצמבר, ינואר, פברואר, מרס, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר	החודש
-----	החודש
-----	החודש
-----	החודש
-----	החודש

מנחרות רגילות, 140 ס"מ + חיפוי שקוף או שחור, זריעה בשטח פתוח, עם חיפוי או בלעדי.

החקלאי הנבון קונה זרעי „הזרע“

המחלקה לירקות של „הזרע“ הכינה זרעים של עגבניות לתעשייה ולמאכל, וכן של מלפפונים, מילונים, אבטיחים, קישואים, בצל, פלפל, חסה, צנונית, שעועית ועוד.


פנה אל הספק שלך ודרוש ממנו זרעי „הזרע“ אל תוותר על האיכות!

הזרע

גידול מיון והספקת זרעים

חיפה, ת.ד. 1565, טלפון: 4-171668

הזרע



היקש, חיפוי פלסטיק שחור ללא כיסוי.
צמחים קטנים יותר ושיעור נביטה פחות.

כיסוי פלסטיק שקוף על פלסטיק שחור; מוסט
הצדה כדי להראות את גודל הצמחים ואת הנביטה
הטובה.

1. פריפאר (2 ליטרים ל-1000 מ"ר). מתן חומר
זה מצריך הצנעה מיכנית ותוספת השקיה קלה. יש
לרסס אותו סמוך לפני מועד הזריעה.

2. אמיבן מתיל-אסטר (מובא מחדש ארצה מ-
ארה"ב, לאחר הפסקת ייצורו, ניתן בשיעור 1.5 ליטר
ל-1000 מ"ר). אם לא מחפים — מרססים אחר
הזריעה ומצניעים את החומר בהשקית ההנבטה
של 20—30 מ"ק לדונם. אם מחפים — יש צורך
בהצנעה נפרדת, בהשקיה שלפני החיפוי והזריעה.
החומר מסיס ביותר, וכמויות מים גדולות מהנ"ל
ישטפו אותו לעומק האדמה ויבטלו את פעולתו
ההרביצידית.

יש לנסות שילובים חדשים של הרביצידים אחדים.
רצוי להתייעץ בנידון זה עם מומחים.

הנחיות נוספות — תבואנה.

לגבי רוחב המנהרה, ודבר זה ייעשה תוך הת-
ייעצות עם מדריכי שה"מ.
חיפוי קרקע

בעונות הקרות חשוב להשיג חימום מרבי, על-
ידי שילוב של מנהרה וחיפוי הקרקע ביריעה
שקופה. בשורות מילון גליה רצוי לחפות גם בעונה
החמה. החיפוי משפר את משטר הרטיבות בקרקע
ובכך מאריך את משך קליטות חמרי המזון. החיפוי
מונע גם רקבונות פירות, במנעו את מגעם עם
האדמה הרטובה. אפשר להשתמש ביריעה שקופה או
שחורה, בהתאם לשיקולים מקומיים, כולל צורך
במניעת נביטת עשבי-בר או בהדברתם ובמניעת
מחלות קרקע. רצוי להתייעץ בנידון זה עם המד-
ריכים האזוריים.

הדברת עשבי-בר (על כל שטח הערוגה)
במילונים יש שני חמרים ברירניים:

„השדה“ מתאבל מרה

על אברהם איילון ז"ל

מדריך חרוץ, סופר „השדה“, חבר וידיד עשרות שנים

שנקפד בעצם עבודתו הברוכה