

תמצא במקום די חם — 26° מעלות צלסיוס בערך, אם הכל כשורה תנמר התסיסה כעבור שמונה ימים בערך, אם אין כעבועות עולות סימן הוא כי התסיסה ננטרה.

החתימה.

אחרי שהתסיסה ננטרה מסירים את הקרום הלבן, את הכר וגם את השכבה העליונה של הכרוב אם היא שנתה את צבעה, מכניסים את הכרוב לחדר קריר ויוצקים עליו שכבה של פראפין חם, הפראפין המתקרר מהווה קרום המונע בעד חדירת האוויר אל הכרוב, עובי שכבת הפראפין יהיה כ־6 ס"מ.

הוראות לאסיף כרובית בשביל משלוח להויץ לארץ.

ישנן שתי מחלות הנורמות לרקבון הכרובית בהמצאה בדרך בזמן המשלוח:

1 *Alternaria brassicae*.

2 *Pseudomonas campestris*.

כדי להבטיח שהכרובית תגיע למחוז הפצה לא ננועה, עלינו להזהר לא לשלוח דאשים המראים סימני המחלות הנ"ל.

הסימנים הם:

1 *Alternaria* הפשירה הזאת נורמת להתהוות כתמים בצורת ענולים, צבע הענולים האלה שונה מצבע יתר חלקי העלה, צבעם של ענולים אלה הוא כהה או שחור לנטרי (בעיקר בצד התחתון של העלה), העוקץ והעורק האמצעי של העלה משחירים.

2 *Pseudomonas* הספיל הזה תוקף בראשונה את שפת העלה ומצחיב אותה. כעבור זמן מה משחירים עורקי העלה, הספיל יורד דרך העלה אל הקלה, המוח של הקלה הנתקף משנה את צבעו ואחרי כן משחיר או אפס ועיי כך נוצרים הקלחים הנכובים, כשחותכים את עוקץ העלה הננוע אפשר לראות נקודות שחורות שהן צנורות הנכעול הננועים.

ראשית יש לברוק בשעת האסיף ויש לשים לב לרברים אלה:

א) אם שפת העלה איננה צהובה.

ב) אם ישנם כתמים שחורים או כהים על העלים.

ג) אם עורקי העלים אינם משחירים.

ד) אם צבע הקלח החתוך איננו כהה ואם הקלח איננו נכוב.

ה) אם העלים העליונים והתחתונים אינם מכוסים נקודות שחורות.

כל הצמחים המראים את הסימנים הנ"ל הם פסולים למשלוח.

בודקים שנית את ראשי הכרובית לפני האריזה ושלישות, טרם ששמים אותם בארנו האריזה הסיוחים, הראשים צריכים להמצא בתוך העלים במשך כל זמן האסיף עד האריזה.

בשעת האסיף והאריזה הכרובית צריכה להיות יבשה בהחלט.