

## הערות על אבוקדו ועל אנונה

ברצוני להעיר הערות אחדות על שני מאמרים, שהופיעו בחוברת ח' של „השדה“.

שבעית גודל הפרי אינה מבוטלת, ויש לנסות להתגבר עליה על-ידי ניסויי דילול.

4. הזן האס מצליח רק בתנאי קרקע טובים בהחלט. וכפי הנראה מתאים לו באופן מיוחד טיפוס קרקע המתאים גם לגידול בנגות. אין לטעת חלקות האס אלא בתנאי קרקע אלה, ובאופן מיוחד לא על אדמות קלות, יחסית.

5. אין להניח, שהזן האס הוא בבחינת „הפתרון הסופי“. יש להוסיף ולחפש זנים מוצלחים עוד יותר, וכך אמנם עושים בקאליפורניה.

6. הנהלת ענף עצי-פרי סובטרופיים, בישיבתה ביום 10.5.66 (בנוכחותו של מר טיכו), החליטה להמליץ על תוספת נטיעה בשלושה זנים, בחלוקה זו: פוארטא 40%, האס 40%, נאבאל 20%.

### ב. מאמרו של ד. ארנון „שיפור הפרי באנונה“

יבואו על הברכה נוטעי קיבוץ מעין-צבי, שידעו לנצל הצעה לשימוש בהאבקה מלאכותית וגם לשפר את השיטה. זכותם גם שלא לכתוב את דבריהם בעצמם ולמסור את החומר למר ארנון.

אך נראה לי, שהיה צריך לציין שהיזמה לעבודה זו באה מעבודת-גמר בשם „בעיות הפריה באנונה חלקה“, שעשה מר י. קריגל בפקולטה לחקלאות, וסיכם אותה בשנת 1960.

פרופ' חנן אופנהיימר

הח' י. טיכו מוסיף בעניין זה:

הערותיו של פרופ' אופנהיימר במקומן. יחד עם זה אישרה הנהלת הענף ב-10.5.66, למעשה, הגדלה ניכרת של אחוז נטיעת הזן האס. 2 הזנים, האס ופוארטא, מודגשים כעת בשווה.

הזן אטינגר אינו מומלץ לנטיעה (אפילו בעמק החולה), כי תהיינה בעיות קשות בשיווקו בעתיד הקרוב.

בהזדמנות זו, אבקש לתקן טעות במאמרי: מייצאים גם פירות אבוקדו, שמשקלם 380 גרם (11 פירות בתיבה), 420 גרם (10 פירות בתיבה), ו-465 גרם (9 פירות בתיבה); אך המחיר של הפירות הגדולים האלה הרבה יותר נמוך (בייחוד בשוקי אנגליה).

### א. מאמרו של י. טיכו על זן האבוקדו „האס“

1. אין חילוקי דעות, שהזן חשוב ומעניין; אך לפי דעתי יש להיזהר מהתלהבות מופרזת, העלולה להביא לידי תלות בלתי רצויה בזן אחד.

2. אין להסתמך יתר על המידה על קאליפורניה, וזה מן הטעמים הבאים:

(א) אמנם נוטעים שם בעיקר את הזן האס, אך זה רק כדי לרפות את התלות המופרזת בזן אחד — פוארטא.

(ב) את האבוקדו של קאליפורניה משווקים בראש ובראשונה באותה מדינה, ואפילו ה„ייצוא“ ליתר החלקים של ארצות-הברית הוא קטן, יחסית. ואילו אנו רוצים להגיע לייצוא של 60% מכלל הייצור, לפחות.

(ג) פירות הזן האס משווקים בקאליפורניה במשך כל הקיץ.

3. אין להניח, שאפשר להגיע ל„יבול ממוצע של 2—3 טונות לד“ בלי סירוגיות. פירוש הדבר,

# מורקייט

**דוחה צפרים**  
**מפירות המטע**

דישון חברה בע"מ  
סוכנות ראשית  
נחל בניסין 24 ת"א





מכתשים  
מפעלים כימיים בע"מ באר-שבע

ייעוץ והדרכה הסחלקה החקלאית ת ד 60