

טיפול וריבוי של נרקיסים

חרות יהל, דורית סנדלר, א' כהן, חנה ליליאן-קיפניס, מרנינה כוכבא

מטרת עבודת הטיפול בנרקיסים היתה לפתח קווים חדשים של מחלקת Tazetta, לגידול בעציץ ולקטיף, עם ריח פחות חריף ועם צירופי צבע שונים, כגון כותרת לבנה, עם כתר צהוב. שני זנים חדשים, "מאיה" ו"הילה", שניהם בעלי כותרת לבנה וכתר צהוב, נרשמו לא מכבר כזנים מוגנים ע"פ זכויות מטפחים, והתווספו לשורת הזנים שטופחו על-ידי קבוצתנו. קוים נוספים בעלי צירופי צבע שונים כבר הגיעו לשלב של פיתוח מתקדם.

במסגרת העבודה נבחנו והושוו שיטות שונות להאצת הריבוי הווגטטיבי של בצלי נרקיסים. שתי שיטות נמצאות כעת בשלבי בדיקה:

(א) חיתוך בצלים בטכניקות שונות כגון: חיתוך צלב, חיתוך לגזרות, תאומי גלדים ותרבית רקמה. התפתחות הבצלים נבדקת עד הגיעם לגודל פריחה. (ב) טיפולי מים חמים, שמטרתם לדכא או להשמיד את קודקוד הצמיחה המרכזי ולעודד את התפתחותם של יותר ניצנים בחייקי הגלדים, וכך להגדיל את מספר הצאצאים מכל בצל. הבצלים נחשפים לטמפרטורות שונות, החל מ- 48°C , לפרקי זמן של 30 דקות עד 4 שעות. תאריך הטיפול נקבע לפי שלב התפתחות הפרח בתוך הבצל. השלב הנכון הוא כנראה כאשר הפרח הושלם בתוך הבצל והגבעולון התחיל להתארך.