

559

2005-2007

תקופת המבחן:

132-1208-07

קוד מבחן:

Subject: INTEGRATED MANAGEMENT OF BOTRYTIS IN LISIANTHUS.

Principal investigator: YIGAL ELAD

Cooperative investigator: YOEL MESIKA, IRIT DORY, MOSHE BRUNNER, NISHRI IEIR

Institute: Agricultural Research Organization (A.R.O)

שם המבחן: התמודדות מושכלת עם בוטריטיס המנגע ליזיאנטוס

חוקר הראשי: יגאל אלעד

חוקרים שותפים: יואל מסיקה, עירית דורו, משה ברונר, אייר נישרי

מוסד: מינהל המחקר החקלאי, ת.ד. 6 בית דגן
50250

תקציר

הצגת הבעיה: עובש אפור-תוקף חמורות ליזיאנטוס בסיס הגבעול בצמח שלם ובפצע הגבעול שנוצר כתוצאה מהקטיף וגורם לתמותת צמחים שלמים או גדים. המטרה היא לאפיין את התופעה, למדוד אמצעים לבקרה של המחללה ולהציג הדבורה מושלבת שלה. מהלך וטיפול העבודה: בניסויים במעבדה נלמדו התנאים להדבקת בוטריטיס בגבעול ליזיאנטוס. נערכו ניסויים בתנאים מסחריים בחוות הבשור בהם יושמו טיפולים אגרוטכניים ותכשירי הדבורה לבקרה המחללה.

תוצאות עיקריות: תנאי לחות וטמפרטורה מיטביים להחפתות המחללה 22-18 מ"ץ אם כי גם בלחות נמוכה עד כדי 65% נתקבלה הדבקה. מעבר בוטריטיס מהעליה לגבעול עוכב מאוד או לא הפתחה כלל בטמפרטורה גבוהה. נמצאה רגישות גבעול שונה בגבים שונים. בשדה הופחתה המחללה על ידי בוטריטיצדים, ירידעה פרוסה על הקרקע, טפטוף טמן, איוורור בתוך החלקה והילול השטילה. יבול הפרחים הושפע מייעילות טיפול החדבורה ולעתים הושפע ישירות ללא קשר להחפתה בוטריטיס. סיון ותכשירים הפחיתו את המחללה גם במעבדה אך שימוש בדישון סידני לא הביא תוצאות משמעותיות כמו הטיפולים האחרים. מדבק של בוטריטיס שרד תקופה ארוכה בקיין וחיטויי קרקע הפחיתו את חיותו. שילוב טיפולים הביא להחפתה רבתה ביותר במחללה ולהפחיתה דרסטית לצורך לרסס תכשירים כימיים.

מסקנות ומלצות: נראה שניתן להפחית מחללה באמצעות קולטוראלים תוך שילוב אמצעי הדבורה ויישום מוגבל של תכשירים כימיים.

פרסומים:

אלעד י, רב דוד ז, שפיאלטר ל, דורית ע, בן יונס ל, מתן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי י, ומור י (2006) התמודדות מושכלת עם בוטריטיס המנגע ליזיאנטוס. מופיע דרום סיכום עונה, תקצירים 05-2004 ע' 16-17 ודיווח מלא באתר המופיע 4 עמי.

אלעד י, רב דוד ז, שפיאלטר ל, דורית ע, בן יונס ל, מתן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי י, מורי י, ירמייהו א (2007) התמודדות מושכלת עם בוטריטיס המנגע ליזיאנטוס. ע' 31 ודיווח דיגיטלי מלא 21 עמי.

אלעד י, רב דוד ד, דורית, בן יונס ל, מותן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי יומור י, ירמייהו א ושפיאלטר
ל (2008) התמודדות מושכלת עם בוטרייטיס המנגע לייזיאנטוס. חוברת תקצירים בעריכת מותן א
(עורץ) מופיע דרום סיכון עונה 25 1 37 25 עמודים באתר

http://www.mopdarom.org.il/frame_master.htm

עובדת גמר של לה שפיאלטר תפרסום השנה באוניברסיטה העברית.

- Shpialter, L., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D., Matan, E., Messika, Y.,
Bruner, M., Nishri, Y., Mor, I. and Elad, Y. (2007) Integrated management of grey
mould (*Botrytis cinerea*) in Lisianthus. *Phytoparasitica* 35:202.
- Elad, Y., Shpialter, L., Korolev, N., Mamiev M., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L.,
Shmuel, D. Matan, E. Messika Y. (2007) Chemical and cultural means of control
integrated for grey mould (*Botrytis cinerea*) management in lisianthus. 15th
International Reinhardtsbrun Symposium on Modern Fungicides and Antifungal
Compounds, Friedrichroda, Germany, 6-10.5.2007.
- Shpialter, L., Elad, Y. Rav David, D, Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D., Matan, E. and
Messika, Y. (2007) Integrating cultural means of control for grey mould (*Botrytis
cinerea*) management in lisianthus. XIVth International *Botrytis* Symposium, 21-
26.10.07 Cape Town, South Africa, p. 73.
- Elad, Y., Shpialter, L., Korolev, N., Mamiev M., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L.,
Shmuel, D. Matan, E. Messika Y. (2008) Chemical and cultural means of control
integrated for grey mould (*Botrytis cinerea*) management in lisianthus. In: Modern
Fungicides and Antifungal Compounds. (P.E. Russell, H.-W. Dehne, eds), Intercept,
Aandover, Hants, UK, pp. in press.

התמודדות מושכלת עם בוטריטיס המנגע ליזיאנטוס Integrated management of *Botrytis* in *Lisianthus*

מוגשת למגן הראשי של משרד החקלאות ולענף פרחים

על ידי

יגאל אלעד, ודליה רב דוד (מחלקה למחלות צמחים ומדע העשבים, מרכז וולקני)
עירית דור, ליאה גנות, דוד שמואל, אליה מתן (מו"פ דרום, חוות בשור)
יואל מסיקה, משה ברונר, יאיר נישרי ויצחק מор (שה"מ)
אוריה ירמיהו (קרקע ומים, מרכז וולקני),
בשיתוף עם תלמידת המחקר לנה שפיאALTER

Yigal Elad, Dalia Rav David (Department of Plant Pathology and Weed Research, The Volcani Center,
E-mail: elady@volcani.agri.gov.il)

Irit Dori, Liana Gnot, David Shmuel, Eli Matan (R&D South), E-mail: md_irit@netvision.net.il
Yoel Mesika, Moshe Bruner, Yair Nishri, and Yitzhak Mor (Extention Service), E-mail:
yomes@shaham.moag.gov.il

Uri Yarmiah (Soil Sciences, The Volcani Center)

In cooperation with the research student Lena Shpialter

יוני 2007

סיוון תשס"ח

המצאים בדוח זה והיום תוצאות ניסויים


חתימת החוקר

הצגת הבעיה: עובש אפור תוקף חמורות ליזיאנטוס בסיס הגבעול בצמח שלם ובפצע הגבעול שנוצר כתוצאה מהקטיף
וגורם לתמותת צמחים שלמים או גדים. המטרה היא לאפיין את התופעה, ללמוד אמצעים לבקרה של המחלת ולהציג
הדברה משולבת שלה.

מהלך ושיטות העבודה: בניסויים במעבדה נלמדו התנאים להדבקת בוטריטיס בגבעול ליזיאנטוס. נערכו ניסויים
בתנאים משלחרים בחותות הבשור בהם יושמו טיפולים אגרוטכניים ותשיררי הדבירה לבקרה המחלת.

תוצאות עיקריות: תנאי לחות וטמפרטורה מיטביים להחפתחות המחלת 18-22 מ"ץ אם כי גם בלחות נמוכה עד כדי
65% נתקבלה הדבירה. מעבר בוטריטיס מהעליה לגבעול עוכב מאוד או לא התחפה כלל בטמפרטורה גבוהה. נמצא
רגישות גבעול שונה בגבים שונים. בשדה הופחתה המחלת על ידי בוטריטיצדים, ירעה פרוסה על ה الكرקע, טפטוף
טמוון, איורורו בתוך החלקה ודילול השטילה. יבול הפרחים הושפע מייעילות טיפול הדבירה ולעתים הושפע ישירות
לא קשר להחפתת בוטריטיס. סיון ותשיררים הפחתו את המחלת גם במעבדה אך שימוש בדיון סיוני לא הביא
תוצאות משמעותיות כמו הטיפולים האחרים. מדבק של בוטריטיס שרד תקופה ארוכה בקייז וחיטויו קركע הפחתו את
חיותו. שילוב טיפולים הביא להחפתה הרבה יותר במחלת ולהחפתה דרסטית בזכות תקשירים כימיים.

מסקנות והמלצות: נראה שnitrogen להפחית מחלת באמצעות אמצעים קולטוראים תוך שילוב אמצעי הדבירה ויישום מוגבל של
תקשיים כימיים.

פרסומים:

- אלעד י, רב דוד ד, שפיאALTER ל, דורי ע, בן יונס ל, מתן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי י, מורי י (2006) התמודדות מושכלת עם
ботריטיס המנגע ליזיאנטוס. מו"פ דרום סיכום עונה, תקצירים 2004-05 ע' 16-17 וDOI מלא באתר המו"פ 4 עמ'.
- אלעד י, רב דוד ד, שפיאALTER ל, דורי ע, בן יונס ל, מתן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי י, מורי י, ירמיהו א (2007) התמודדות
מושכלת עם בוטריטיס המנגע ליזיאנטוס. ע' 31 וDOI מלא עמ'.
- אלעד י, רב דוד ד, דורי ע, בן יונס ל, מתן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי י, מורי י, ירמיהו א ושפיאALTER ל (2008) התמודדות
מושכלת עם בוטריטיס המנגע ליזיאנטוס. חוברת תקצירים בערךת מתן א (עובד) מו"פ דרום סיכום עונה 2006-07 ע' 37 ו

- Shpialter, L., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D., Matan, E., Messika, Y., Bruner, M., Nishri, Y., Mor, I. and Elad, Y. (2007) Integrated management of grey mould (*Botrytis cinerea*) in Lisianthus. *Phytoparasitica* 35:202.

Elad, Y., Shpialter, L., Korolev, N., Mamiev M., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D., Matan, E., Messika Y. (2007) Chemical and cultural means of control integrated for grey mould (*Botrytis cinerea*) management in lisianthus. 15th International Reinhardtsbrun Symposium on Modern Fungicides and Antifungal Compounds, Friedrichroda, Germany, 6-10.5.2007.

Shpialter, L., Elad, Y., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D., Matan, E. and Messika, Y. (2007) Integrating cultural means of control for grey mould (*Botrytis cinerea*) management in lisianthus. XIVth International *Botrytis* Symposium, 21-26.10.07 Cape Town, South Africa, p. 73.

Elad, Y., Shpialter, L., Korolev, N., Mamiev M., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D., Matan, E., Messika Y. (2008) Chemical and cultural means of control integrated for grey mould (*Botrytis cinerea*) management in lisianthus. In: Modern Fungicides and Antifungal Compounds. (P.E. Russell, H.-W. Dehne, eds), Intercept, Aandover, Hants, UK, pp. in press.

מבוא ותיאור הבעייה

הלייזיאנטוס (*Eustoma grandiflorum*) משמש כפרח קטיף וכעכיץ פורה. בישראל יש כיום כ- 460 דונם לייזיאנטוס בתקופת החורף ועוד כ- 160 דונם בקיץ; רוב הגידול החקורי הינו באזורי הנגב, הבשור והערבה, הפרחים משווקים ליצוא בעיקר בחורף ובאביב. מחלות העובש האפור הנגרמת על ידי *Botrytis cinerea* (בוטרייטיס) עלולה לפגוע בפרחים וגס ריקבון בסיס הגבעול העולול להביה לתמונות הצמח. רק פרסום אחד מזכיר את המחלת (Wolcan et al., 1996). לייזיאנטוס נשתל מסוף אוגוסט עד אמצע אוקטובר. עד להופעת גל פריחה ראשוני צורך הגידול מים רבים. גל זה נקבע מספר שבועות בדצמבר – ינואר ובקטיף מותיר גדמי גבעול. הגל השני נקבע במרץ עד מאי. חימום החלקות שהייה נהוג בעבר חופסק בגלל עליות. המחלת בסיס הגבעול מתרחשת כאשר הנוף נעשה סבוך והיא גורמת לתמונות בכ- 10-25% מהצמחים ואפ' יותר. תוכנית המחקר מתמקדת בבוטרייטיס בסיס הגבעול.

כמה הליזיאנטוס מפתח שוננת עלים ממנה עולים גבעולים. ניתן בד"כ בגידולים שונים להילחם בבוטריטיס באמצעות אוורור וחימום, אך בליזיאנטוס בגל צפיפות השטילה וכן בגל שקיים הרבה עלים קרוב לקרקע, בקרת אקלים כגון אוורור וסחרור אויר במבנה מועילים חלקית בלבד. המחלה מופיעה בשטח לעיתים בכתרים, יתכן בגל תנועת אויר מוגבלת בסבך הגידול או בגל אופי המדק הראשמי. גבעולי ליזיאנטוס שנתקפו בבוטריטיס מתיבשים ובכליים לעיתים קישוונות. לא קיים מידע על זנים עמידים לבוטריטיס בגידולים שונים ובכלל זה בליזיאנטוס אך בשטחים נצפים זנים עם נגיעות חמורה מהאחרים (לדוגמא זו אקו לבן). יתכן שרמת הנגיעות קשורה באופי הצימוח, ככלומר זנים בעלי צימוח רב יותר יוצרים נוף צפוף וסביר יותר ותנאים טובים יותר להתרפות המחלה. תופעת הנגיעות בגבעולים מתרחשת בגידולים שונים אך נראה שבლיזיאנטוס היא שונה ממה שהכרנו בצמח עגבניה (O'Neill et al., 1997) ובזיל (Sharabani et al., 1999). הפטריה בוטריטיס יוצרת על גבי נושא נגעים אשכולות של נגעים אל מינאים המתפזרים באוויר. קישוונות גדולים ושחורים נוצרים במספר גידולים ועליהם נמנים גם הליזיאנטוס. על גידולים שנתקפים על ידי בוטריטיס נמנים גידולי חממה ושטח פתוח כגון עגבניה, מלפפון, חציל, פלפל, רוסטוקס, וורד ופרחים אחרים, גפן ועוד (Elad et al., 2004ab). החדרה לפונדקאי יכולה להתבצע על ידי קורי נבטה של הנגעים או על ידי תפיר שהתבסס על חלקו צמח מסוים או חיות. טווח הטמפרטורה המאפשר התפתחות עובש אפור הינו 30-32 מ"ץ הביאה להפחיתה נגיעות בגבעול (Eden et al., 1996) אך ההתרפות לארוך בגועל העגבניה הייתה מהירה יותר - 30 מ"ץ (Shtienberg et al., 1998). המחלה מתפתחת בתנאי לחות יחסית גבוהה (מעל 90%) ונכנית נגעים מתרחשות בנסיבות מים חופשיים, אך יתכנו מקרים בהם המחלה מתפתחת גם בתנאי לחות נמוכה יותר. לדוגמה, בפציע בגבעול בעגבניה ובזיל נמצא שתנאים המיטביים להדבקה הינם 75-85% לחות יחסית (Neill et al., 1999; O'Neill et al., 1997). יתרה מזאת, התפתחות הנגיעות לאורך עלים וגבעולים בעגבניה הייתה מהירה יותר בחות יחסית נמוכה

(Shtienberg et al., 1998). נגיעות פצעי גבעול גם בתנאי לחות נמוכה יחסית נובעת מקיים רטיבות מספקת באתר ההדבקה שמקורה בצמח (Wilson, 1963; Eden et al., 1996; O'Neill et al., 1997).

נוגדים נפוצים בחממות לא מחוממות עם שינוי לחות, בעיקר בזמן המעבר מלחות גבוהה לנמוכה (Elad and Shtienbeg, 1995). קשיינות לא נמצא עד כה כבולי חшибות בהדבקה של צמחים בחממות או בהשמדות הפטריה (Yunis and Elad, 1989). לעומת זאת, בחיל' דוח בכמה מקרים על תפקיד הקשיונות בהשמדות (בחורף קר) בכרמיים, נביטה באמצעות קורים וכיירת נוגדים על גבי הקשיונות (Nair and Nadtotchei, 1987).

תמותת צמחים כתוצאה מגיעות בוטריטיס בגבעול הינה תופעה נפוצה (Dik and Wubben, 2004). בהולנד נמצא שמספר מוקדי הנגיעה בגבעולי מלפפון פחות בחממות יבשות, יחסית לחממות עם לחות יחסית גבוהה אך מבין הצמחים הנגועים, יותר צמחי מלפפון מתו כתוצאה מגיעות גבעול בתנאי יובש מאשר בתנאי לחות גבוהה (A. Dik, 2004).

הולנד, מסירה אישית). ואכן בחממות ירקות מצאנו שבמהלך השנים האחרונות יושמו המלצות לאיוורור ויבוש האוויר בחממה ונכפות פחות הדבקות עלים מבעבר אך בד יותר נגיעות בגבעולים המסתיעות בתמותת צמחים מבוגרים. בעבר המלכנו על חיפוי קרקע להפחיתה בוטריטיס בירקות חמה (Elad, 1998; Elad, 2000). במסגרת פרויקט בעגבניות שרי בחות הבשור מצאנו שחיפוי קרקע משפייע על האקלים בחממה ומונע התפרצויות כימון (שטיינברג וחובי, 2004). הרכב החדש עשוי להשפיע על רגישות צמחים למחלות. בעוד תוכאות סותרות התקבלו עם חנקן, נגיעות בבוטריטיס פחתה עם העלאת ריכוז הסידן במיל החשקייה בורד, רוסקיס, עגבניה, פלפל, חציל ומלפפון וכאשר עלה ריכוז הסידן ברקמות המוגנות (אלעד וחובי, 2000; Bar Tal et al., 2001; Stall et al., 1965; Starkey 1991).

(Volpin and Elad, 1991; and Pedersen, 1997;

התכשירים המורשים להדברת בוטריטיס בלייזיאנטוס הם מיטוס ורוברל. מזה מספר שנים נכנסו לשימוש בחקלאות פונגיצידים יעילים להדברת מחלות הנגרמות על ידי בוטריטיס מקבוצות כימיות כגון האנילינו-פירמידינים, פנילפירותים והидרוקסיאנילודים עליהם נמנים ההיידרוקסיאניליד טלדור (fenhexamid) האנילינו-פירמידינים פרופיקה (pyrimethanil), מיטוס (mepanipyrim) וסוויך שהינו תערובת של אנילינו-פירמידים ופנילפирול (fludioxonil, cyprodinil, cyprodinil), בהתאם. יש צורך לבדוק תכשירים נוספים אך להימנע מריסוסים מיותרים ולפתח חלופות אגרוטכניות ואחרות כדי למנוע התפתחות עמידות.

מטרת המחקר הינה לימוד של מחלת הבוטריטיס בלייזיאנטוס ובנויות מערך הדבירה כוללני שיאפשר בקרת מחלת תוך פחיתה בשימוש בתכשירים כימיים. המטרות הספציפיות הינה: אפיקו הגורמים (מיקראקלים, תנאי גידול ואגרוטכנית) המעודדים את שלבי המחלת השונים (הדבקת עלים וגבעולים, אכלוס הגבעולים, התמותות הצמח, הירשרות) ותפקיד הקשיונות בלייזיאנטוס; איתור תנאים מගבלים להתקפות המחלת; בחינת אמצעי הדבירה אגרוטכניים ואחרים; בניית מערך הדבירה מושכלת המתבססת על ממצאי המחקר.

ניסויים ותוצאות

ניסויים נערכו במעבדה ובתאי צמיחה, בחמתת ניסויים במרכז וולקני ובחות הבשור. במרכז וולקני גדלים הצמחים בעציים בעוד בחות הבשור נשטו הצמחים באדמה בחממות בגודלים שונים. התוצאות מודגמות בציורים וטבלאות מלאות בნיספחים. חלקם מובא באנגלית מאחר כבר סוכם למאמרים.

ההדבקה בגבעול – נבדקו שלוש צורות מידבק: 1. תרחיף נוגדים; 2. אילוח יבש (פייזר הנוגדים בעורת זום אויר); 3. דיסקית תפיר בצמחים שלמים. הדבקה של גדמי הגבעול בצמח השלם הייתה מוצלחת בכל צורות ההדבקה (ציור בטבלה 1.1). לא היו הבדלים בין סוגים המדק בחרומרת הרקבון, אבל רמת ההנגובה הייתה גבוהה יותר בצמחים שהודבקו באמצעות תרחיף הנוגדים, דבר המעיד על התקדמות מהירה יותר של ההדבקה. שיטת ההדבקה של גדמי גבעול ועלים שפותחה מתבצעת ב- 20 מ"ץ ובלחות יחסית מעל 95%, בחדרי צמיחה. תרחיף נוגדי בוטריטיס (מ"ל⁵) וחומר מיון (0.1%) הביא להתקפות ריקבון הרב ביוטר.

מאחר ובחלקות ליזיאנטוס מסחריות מתרחשת הבדיקה באתרים ספציפיים על גבי הגבעול עלתה האפשרות שרגשות הגבעול משתנה עם גובה הגדם בצמחי. הגבעול של צמחי ליזיאנטוס נקטם בפרק 1 עד 6 והודבקו בדיסקית תפטר. הריקבון התפתח בעוצמה רבה יותר בגדמים מפרק 5-3, בפרק 2 המחלה התפתחה לאט יותר ובפרק 1-6 הייתה חומרת המחלה מועטה ביותר. רמת ההנגעה הייתה גבוהה יותר בהדבקת גדם מפרק 4. לפיכך, נמצא שלמרות שהמחלה מופיעה בפרק הנמוך ביותר, פרק זה אינו הריגש ביותר למחלה (ציר 1.2). בניסוי נוסף (ציר 1.3) הודבקו גדים בגבהים של הפרקים 5-0 וקטעי גבעול שמקורם בפרק 5-4 ונחטכו אופקית או אנכית, בתרחיף נגבים. ההבדל הבולט בהתפתחות המחלה בקטעי גבעול ובגדמים על גבי הגבעול היה דומה לניסוי הקודם; חומרת המחלה הרבה יותר במרקם האמצעיים. הנגעה הייתה פחותה בגדם הפרק הצער יותר.

מאחר ובחלקות ליזיאנטוס נפתחה הדבקת המחלה לעליים גבעולים מעליים נגעים וכן נמצא הבדל ברגשות המחלה בגבהים שונים, בחנו את התקדמות המחלה בעליים לעבר הגבעול בשני גבהים. עליים על גבי צמחים בעיצים הודבקו במרכזים וכובע התקדמות הריקבון לעבר הגבעול נבחן בתנאי טמפרטורה 26-18 מ"ץ וארבעה משטרי לחות יחסית מעל 90% (ציר 1.4). בעליים העליונים והתחתוניים התקדמה המחלה לעבר הגבעול מהר יותר בטמפרטורה 22-26 מ"ץ בעוד ב-26 מ"ץ היא לא התקדמה או התקדמה לאט (ב-99% לחות יחסית). בטמפרטורה 18 מ"ץ התקדמה הנגיעה מהר יותר בלחויות הנמוכות יותר. כובע כובע התקדמות המחלה לעבר הגבעול. הקצב היה נמוך יותר בטמפרטורה 26 מ"ץ (פרט ל-99% לחות יחסית). הקצב היה גבוה יותר בדרך כלל בעליים תחתוניים לגבהים (ציר וטבלה 1.4). כמו כן נמצא שבטמפרטורות 18 ו-22 מ"ץ התפתח ריקבון בשעור של עד כדי 75-20%-50% מהגביעול בעוד בטמפרטורה 26 מ"ץ לא נפלו הגבעולים.

נבדקו טווח הטמפרטורות (29-12 מ"ץ) ולחות יחסית (65-99%) להדבקת קטעי גבעול (ציר וטבלאות 1.5). חומרת המחלה פחתה במידה מסוימת עם הירידה בלחות היחסית. בלחות גבוהה ההתפתחה המחלה לאט יותר בטמפרטורות הקיצון 12 ו-29 מ"ץ, במקרה השני היא איטית יותר לאין ערוך (ציר 1.5). קצב ההתפתחות המחלה המרבי היה בתנאי 18 מ"ץ ולחות יחסית 65%.

טווח התנאים לבדיקת הריקבון בגדים גבעול על גבי צמחים שלמים היה מצומצם יותר (ציר וטבלה 1.6). בלחות גבוהה (99%) היה הבדל מועט בהתפתחות הריקבון בין הטמפרטורות (26-18 מ"ץ). בלחות הנמוכה (75-85%) ההתפתחה המחלה פחתה בטמפרטורה הגבוהה, נראה בגלגול גרעון לחץ אדים גדול יותר. בניסוי זה קצב ההתפתחות הריקבון היה גבוה יותר בלחות גבוהה ובטמפרטורה 22 מ"ץ (טבלה 1.6).

עווצמת הكريינה במעבה נוף הליזיאנטוס נמוכה מזו של פני הנוף בשוליים וכן נבדקה השפעתה על רגשות המחלות כל שעלה עוצמת האור החמירה המחלה וגברה ההנגעה (ציר וטבלה 1.7). ככל מר לא נראה שעצמת האור המוחלשת מגבירה את המחלות. לאור הרים שנוצר על שכיחות או חומרה גבוהה יותר של בוטרייטיס בזנים מקובעת האקו שמאפיין, נערך ניסוי לבדיקת רגשות קטעי גבעול ובעליים לבוטרייטיס, תוך הדגשה בתנאי טמפרטורה ולהות מיטיבים. נראה שركמת הגבעולים בזן אקו שמאפיין רגשות מזו של זן קטלינה צחוב אך רגשות העליים של אקו שמאפיין הייתה גבוהה יותר (ציר 1.7). ניתן ששבטחים אופי גידול הזנים שונה והוא עשוי להשפיע על תנאים בקרב הגידול ועל הופעת המחלות אך נושא זה לא ניתן לבדוק במעבדה.

בגלל חשש מוקדם בקשר למקור הבוטרייטיס בשתילים, ניבחנו שתילים שניים מקורות, מקומי (חישתייל) ויבוא מהולנד, 50 צמחים מכל מקור, לאפשרות שהם נושאים לבוטרייטיס. השתילים הוגדרו בתנאי תא לח ב-20 מ"ץ לשש ארבעה שבועות. לא נמצא כל מוקדי נגיעה בבוטרייטיס בצמחים שהוגדרו בתא לח ועל ידי נסיבות בידוד למשך מזון.

בחינת תכשירי הדבורה - נבדק פוטנציאלי ההדבורה בריסוס של התכשירים טלדור (fenhexamid), רוברל (iprodione), מיטוס (pyrimethanil), פולאר (AL polyoxin), סוויז' (cyprodinil + fludioxonil) וסילבקרור (dichlofluanid), טיבוקונזאול (tebuconazole +), בעליים ובמבחן הגבעול ביחסם לפני ואחרי הבדיקה בתרחיף נגבים (ציר וטבלה 1.8). ביחסם המקיים את הבדיקה בעליים נמצאו עליים כל התכשירים ורטיסם בסידון היה גרווע מההיקש. בקטעי גבעול היו התכשירים פולאר, סילבקרור וטלדור פחתות עליים וסידון לא היה עיל (ציר וטבלה 1.8). ביחסם לאחר הבדיקה נמצא רוברל ומיתוס היעילים ביותר בקטעי גבעול וכל התכשירים בעליים בעוד סידון לא היה עיל.

בעקבות תוצאות אלה ובעקבות התוצאות בניסוי 3 בחוות הבשור (במהשך) נבדקו מספר תכשירים בהגעה לשם שיפור פעילותם ולקראת הניסויים בשדה בעונת 2007-2006. מיתוס הפחתת המחלה בשני מינונים בקטעי גבoul ובצמחים שלמים וטלדור אף הוא הפחתת המחלה אך במידה פחותה. דשן המכיל סידן הפחתת המחלה במידה ההפחתה ביותר (ציורים וטבלה 9).

מחוזר החיים של הפטרייה - נערך מעקב אחר הדבקות בוטרייטיס בחלוקת ליזיאנטוס בחוות הבשור, לאחר שבסס מוקד נגיעה בחלוקת. נמצאו הדבקות בעליים הסטומוכים לקרקע. ריקובן העלים מתקדם לעבר בסיס הגבoul בצמחים שלמים ובדמים לאחר קטיף. נגפה הדבקה מעלה נגוע של צמח אחד לעלים של צמח שכן. נגיעות בסיס הגבoul נובעת מהדבקה מעליים ומהדבקה ישירה. לאחר הקטיף נוצר גדם ובו הפעז נדבק ישרות. לפיכך התקדמות בוטרייטיס בין צמחים מתקיים אך לטוח קצר במהלך העונה. נגים רבים נוצרים בסיס הגבoul והם נפוצים באוויר. במעט צמחים נגועי בוטרייטיס נמצאו קשיונות על גבי השורשים.

השפעת הדבקת עליים תחתוניים ומונעת התפתחות הריקבון - לאחר וצפינו בחלוקת הניסוי בשדה שmachala בסיס הגבoul עשוייה להיגרם מנגיעות בעליים הסטומוכים לקרקע, בדקנו את השפעת ירידעה הפרוסה על הקרקע על הדבקת עליים אלה בוטרייטיס. בעליים הודבקו בטיפת תרחיף נגים ונבדלו ביניהם רק במנגע עם הקרקע (ציור 10.1). עליים שהופרדו מהקרקע על ידי ירידעה פוליאתילן נבדקו בוטרייטיס אך בחומרה פחותה (ציור 10.1).

ניסויים בחממות הלחות בקרבת הגידול - בניסויים בגידול מסחרי בחוות הבשור במנהרות עבירות ובחממתה נבחנתו ייעילות אמצעים להפחחת הלחות בקרבת הגידול, דישון סיידי מוגבר וכן תכשיiri הדבורה. הטיפולים יושמו לבדים ובשילובים דו ותלת גורמיים.

ניסוי שדה ראשון (מנהרות עבירות בחוות הבשור, 2004 2005). בעונת 2004 2005 נערך ניסוי הקדמי במנהרות בחוות הבשור להפחחת הלחות בגידול ומונעת בוטרייטיס (ניספח 2). בניסוי זה נבחנו אמצעים אגרוטכניים להפחחת הלחות באזורי בסיס הגבoul כדלקמן : 1. חיפוי קרקע - פריסת ירידעה על גבי הערוגה – פרקטיקה שנostonה בעבר נגד בוטרייטיס בחממות ירקות ולאחרונה נמצאה יעליה בהורדת הלחות, מניעת רטיבות הנוף והפחחת כימישון בעגבניות. (תמונה 2-1).

2. טפטוף טמן – הטמנת הטפטוף עשויה להביא להפחחת הלחות בקרוב נוף הגידול הסמוך לקרקע.

ב- 04/10/23 נשתל ליזיאנטוס מזון אקו שמפיין ב- 4 מנהרות (כל אחת כ- 50 מ"ר) בצפיפות של 60 צמחים למ"ר. ארבעת הטיפולים (אחד במנהרה) היו : 1. טפטוף טמן עם חיפוי קרקע; 2. טפטוף טמן ללא חיפוי קרקע; 3. טפטוף עילי עם חיפוי קרקע ; 4. טפטוף עילי ללא חיפוי קרקע. במסגרת הניסוי נערכ מוקב אחת לשעה אחר טמפרטורה, לחות יחסית ונוכחות מים חופשיים באזורי בסיס הגבoul באמצעות אוגרי תנומות. צמחים מתרים נערקו ונספרו אחת לשולשה עד ארבעה שבועות ומונינו לפי התسمינים לאלה שנפגעו מבוטרייטיס, פוראים או ללא תسمינים. המ Zachim האחוריים לא ניתנו היה לבודד כל גורם מחלה. כמו כן נבחנו כמות ומשקל הפרחים ואיכותם. כדי ללמידה על קשרי אקלים-מחלה סוכמו מזדי המיקרואקלים לפי מידת שכיחותם בשבועות לשבעה בתוכומים מספריים שונים (תחומי לחות יחסית ותחומי טמפרטורה). נבדק המתאם בין שכיחות מזדי המיקרואקלים האלה בשבועות שלפני הערכת המחלה בין רמת המחלה והשינוי במחלה.

תמותת צמחים התרחשה מאוחר יחסית בעונה, והערכה החל מחודש אפריל 2005. חיפוי קרקע, טפטוף טמן ושילוביהם הפחיתו את נגיעות הצמחים בוטרייטיס. במהלך ההערכה נמצאה גם תמותת צמחים הרבה שלא נגרמה על ידי גורם פתוגני, או שנגרמה על ידי פוראים. נראה שטיפול הניסוי הפחיתו במידה מסוימת גם את התמותה מפוזרים אך לא את התמותה שלא נגרמה על ידי פטריות פתוגניות. צמחים אלה היו בעלי שורש מסולסל ונראה שמערכת השורשים שלהם לא הפתיחה קריאו ללא קשר לפגיעה פתוגנית.

בגל הפריחה הראשונית לא היו הבדלים בין הטיפולים בין היבול הפרחים והיבול היה כצפוי כ- 70-65 פרחים למ"ר. בגל הפריחה השנייה, הטיפול ששילב טפטוף טמן וחיפוי קרקע היה בעל היבול הגבוה ביותר והניב כ- 133 פרחים למ"ר. טיפול החיפוי הניב יבול נמוך באופן מובהק (85 - 98 פרחים למ"ר) מהטיפול ששילב טפטוף טמן וחיפוי קרקע. שני גלי הפריחה, לא ניכרה השפעה של חיפוי הקרקע וסוג הטפטוף על איכות הפרח: משקל הפרח, אורך הפרח ומספר הפעmons בתפרחת. הפריחה הوكדמה בטיפול המשולב של טיפול המושלב טפטוף טמן וחיפוי יחסית לטיפולים האחרים (טבלאות 2-2).

נדדו נתונים מיקרואקלים כגון טמפרטורה, לחות יחסית ורטיבות העליה. בכל חממה הוצבו קוראי נתונים אלקטרוניים שמדדו את הטמפרטורה והלחות היחסית, וקורא נתונים אלקטרוניים שמדד את נוכחות הטל. נצפו לחות

גבואה יותר ונוכחות טל ממושכת יותר בטיפול ההיקש. בהשוואה לטיפולי הטפטוף הטמון וחיפוי الكرקע (צ'ור 2.2). בעונת גידול 5/2004 חושבו ערכי הקורלציה בין נתוני מיקרואקלים ורמת המחלה שנמצפה בחממות באוטה עונה. מדידות מיקרואקלים נעשו מספר שבועות (שבוע, שבועיים ושלוש שבועות) לפני הערצת המחלה. בחישובי המתאים בין ערכי המחלה לשאך הזמן בו שררו תנאי מיקרואקלים שונים נמצא שתמונות צמחים הייתה מוגדרת כמתאusta חיווי גבואה (>0.95). ערך המחלה לשאך הזמן גבואה – מעל 25 מ"ץ ובמידה רבה יותר מעל 30 מ"ץ. מוגדר גבואה נמצאת גם עם לחות יחסית גבוהה – מעל 90% באזורי בסיס הגבעול. נמצא מעניין זה מזכיר תוצאות קודומות בבוטריטיס במלפפון ועגבנייה. בגידולים אלה אמנים נמצאה הדבקת גבעול רבה בלחות גבואה וטיפורטורה נוחות (5±20 מ"ץ) אך תמונות הצמחים כתוצאה גבואה אך בגבעול הייתה גבואה דזוקא בלחות יחסית נמוכה. נראה שאמנים הדבקת הצמת בבוטריטיס מתרחשת בלחות גבואה אך התמונות מתגברת בתנאי עקה הנגרמים על ידי טיפורטורה גבואה יחסית. ניתן להנימיך לטיפולי הניסוי הפחיתו את התנאים להדבקת בסיסי הגבעול בבוטריטיס בעודו השפע מתנאי חמה אחרים. הנושא דורש מחקר נוספת.

ניסוי שדה שני (מנהרות עכירות בלחות הבשור, 2005-2006). טיפול הניסוי היו: 1. חיפוי الكرקע בבניו הראשוני; 2. דישון מוגבר בסידן (תוספת 40 ח"מ); 3. ריסוס בסידן (2% קלניט) (נספח 3). לא נבדק אופי הטפטוף. הניסוי שנשתל ב-12.9.05 ואולח באופן מלאכותי על ידי הדבקת צמתה בזוד בקצת המערבי של כל חלקת ניסוי ב-1.12.05. המחלה החלה להופיע 40-50 יום מהailות. עד תחילת חדש מרץ נמצאו 18-10 גדים מתים בחלוקת ועד כ-2 צמחים שלמים בחלוקת אשר נפגעו מבוטריטיס. החיפוי הפחתת את המחלה באופן דרמטי (צ'ור וטבלה 1).

חיפוי الكرקע הפחתת את הלחות היחסית ומשך נוכחות הטל (צ'ור 3.3). בגל הפריחה הראשוני יכול הפרחים בטיפול ללא חיפוי (54 פרחים למ"ר) היה גבוה באופן מובהק ($P=0.0002$) בהשוואה לטיפול חיפוי (43 פרחים למ"ר). הבדלים אלו ביבול נבעו ככל הנראה מיישום לא נכון של חיפוי الكرקע, שלא היה צמוד לקרקע כמתבקש וגורם לכך לפגיעה בשתילים הצעירים ולירידה בכמות הצמחים שנקלטו (צ'ור 3.3). בגל הפריחה השני טיפול הניסוי לא השפיעו על יכול הפרחים. שני גלי הפריחה טיפול הניסוי לא השפיעו על איקות הפרחים (אורוך פרת, משקל פרת ומספר הפקעים בתפרחת). שעור הפרחים שהקדימו פריחה בגל הראשוני היה גבוה יותר בטיפול הסידן בטפטוף עם סידן בריסוס, חיפוי עם ריסוס ובמידה רבה יותר בטיפול חיפוי עם דישון סידן בטפטוף וחיפוי עם דישון בטפטוף וריסוס (ט' 2.3). בגל השני הוקדמה הפריחה בטיפול חיפוי עם דישון בסידן יחסית לטיפולים האחרים (ט' 3.4).

במהלך הגידול נדגמו עליים וגבועל לבדיקת תכולת יסודות. בדגימה הראשונה נגם עליה רביעי מלמעלה מצמחים פרחים (30 עליים לחלקת). במועד הדגימה השני נדגמו עליה תחתון ועליוון וכן הגבעול. באופן כללי ריכוז הייסודות בטיפול החיפוי גבוה יותר בהשוואה ללא מחופה ובכל זה הסידן. ריכוז הסידן בעליים עליה בהשפעת טיפול הסידן. נמצא הבדל בתוכולות סידן בעליים בוגרים וצעירים – יותר סידן בעליים מבוגרים (טבלה 3.5).

ניסוי שדה שלישי (חממה בלחות הבשור, 2005-2006). הניסוי בוצע בשיתוף עם צביקה אברהם מחברת לידור. בניסוי זה נשתלו הצמחים ב-12.9.06 בעומד צפוף של 70 צמחים למטר ובעומד מדורל של 50 צמחים למטר. בכל עומד ישמו תכשיiri הדבירה נגד בוטריטיס (טלדור, 0.15%; מיתוס 0.25%; טלדור, מיתוס ורוברל 0.1% לחילופין) ובמועד הצפוף גם תכשיר סידן ניטראטי (2% קלניט) (נספח 4). דילול השטילה הפחתת את שכיחות-תמונות הצמחים השלמים והגדמים מבוטריטיס. הפחתת המחלה בפרחים לא נמצאה מובהקת, אך בעקבות ריסוס בקלניט נמצאו יותר פרחים נגועים מאשר בטיפול במיתוס. בתום תקופת ההערכה בגל הראשוני (ט' 3.06) נותר מספר דומה של צמחים בריאים בחלוקת שני העומדים וזאת למורות שבתחילתה נשתלו 40% יותר צמחים בעומד הצפוף. שני העומדים הופחתה המחלה על ידי תכשיiri ההדבירה הכימיים ('יבוטריטיצידים'), נראה שהמיתוס היה יעיל יותר מהטלדור. ריסוס קלניט הפחתת את המחלה במהלך התקופה פחתה מתכשיiri ההדבירה אך בתום הגל הראשוני היה מספר הצמחים הנגועים בטיפול זה דומה להיקש (צ'ור וטבלה 4). שעור המחלה בגל השני היה נמוך ולא הבדלים בין הטיפולים (צ'ור 4.3).

توزעות היבול מובאות בספח 4 (צ'ורים 3.2-3.4 וטבלאות). שני גלי הפריחה עומד השטילה השפיע על מועד הפריחה. בגל הראשוני בעומד השטילה המרווח (50 למ"ר) הפריחה החלה 5-4 ימים מוקדם יותר מאשר בעומד הצפוף (70 למ"ר). גם בגל השני עומד השטילה המרווח הקדים לפרוח בהשוואה לעומד הצפוף. יכול הפרחים בגל הראשוני היה גבוה יותר באופן מובהק בעומד השטילה הצפוף בהשוואה לעומד השטילה המרווח. בגל השני לעומד השטילה לא הייתה

השפעה על היבול לעומת זאת טיפול החדירה: מיתוס, אלטרנטיבית וטלדור הניבו יבול גבוה יותר באופן מובהק בהשוואה לטיפול הביקורת. הטיפול בקלאטיביטה הייתה רק בעומד השתייה הצפוף הניב יבול דומה לטיפול הביקורת. למעשה טיפול והטיפול בקלאטיביטה בהם הייתה רמת מחלה גבוהה הניבו יבול נמוך יותר בגל השני. בגל הראשון הטיפולים לא השפיעו על אורך הפרחים אולם לעומת זאת השתייה הייתה מובהקת סטטיסטית על משקל הפרח ומספר הפוקעים בתפרחת. בעומד השתייה המרוווח היה גבוח באופן מובהק בהשוואה לעומד השתייה הצפוף. גם מספר הפוקעים בתפרחת בעומד המרוווח היה גבוח באופן מובהק בהשוואה לעומד השתייה הצפוף. בغال השני צפיפות השתייה השפיעה על אורך הפרח. בעומד השתייה המרוווח הפרחים היו ארוכים יותר באופן מובהק בהשוואה לעומד השתייה הצפוף. משקל הפרח ומספר הפוקעים בתפרחת הושפעו דווקא מטיפול החדירה. בטיפול הביקורת משקל הפרח ומספר הפוקעים בתפרחת היה גבוח באופן מובהק בהשוואה לטיפול החדירה (מיתוס, אלטרנטיבית וטלדור). מספר הימים עד לפריחה בגל הראשון היה פחות בחלוקת השתייה הדיליה בהשוואה לשתייה הצפופה (טבלה 4.2). אחוז הפרחים שנקטפו בגל השני היו גבוחים בغال הראשון מכל הפרחים שנקטפו בשני הימים ושורר הפרחים שנקטפו בקטיפ הרראשון של הגל השני היו גבוחים

בחלוקת הדיליות ביחס לחלוקת הצפופות (טבלה 4.5)

השפעת חיפוי קרקע, איזורור בתוך העורוגה וטיפול כימי על תחלואת לייזיאנטוס בעובש אפור (ניסוי חממות בחווות הבשור 2006 2007). נבדקה ההשפעה של חיפוי קרקע, טיפולים כימיים ואיזורור מאולץ של נוף הגידול על הופעת המחלה. הניסוי נערך בשתי חממות מסחריות (פרוייקט 16). חממה אחת הייתה עם קרקע מחופה ביריעת פוליאתילן בצעב שחור-כטוף (גניגר) וחממה שנייה עם קרקע חשופה. בכל חממה היו טיפולים איזורור מאולץ שניתנו לחצי מהחלוקות בחממה (18 חלקות) במחלך הלילה בלבד. בכל חממה בוצעו טיפולים כימיים נגד בוטרייטיס: ריסוס של סויז 0.1% וריסוס של מיתוס 0.25% במרסס גב והגעה של מיתוס 500 גרים/דונם דרך מערכת השקיה (טיפול האחרון לא הצליח ולכן לא ידועה). צמחי לייזיאנטוס מן "אקו שמיינן" נשתלו ב- 6/9/2006 בעומד של 70 צמחים למ'ר' ואולחו בזרחה מלאכותית.

על ידי הדבקת צמח בודד בתחילת כל חלקת הניסוי ב- 12/14/2006. המחלה החלה להופיע 40-60 ימים לאחר האילוות. בניסוי זה היו שלושה גורמי טיפול: א' חיפוי קרקע, ב' יישום תכשירים כימיים - ריסוס מיתוס וסוויז', איזורור מאולץ של נוף הגידול (נספח 5). רמת המחלה בהיקש הייתה נמוכה עד כדי 16 גדים נגעים לחלקה בלבד. בכלל לא נמצא הבדל בין טיפול החיפוי לקרקע חשופה (טבלה 5.1). נראה שהסיבה לכך היא קריעת חורי שתייה גדולים בפוליאתילן אשר אפשרו מעבר בין העלים התת חתוניים לקרקע הרטובה. השפעת גודל החור בפוליאתילן נבדקה שנה לאחר מכן ותדועה בהמשך. תנעuta איזורר מאולץ בתוך השורות הפתיחה את המחלה באופן מובהק (טבלה 5.1). התכשירים הכימיים הפחיתו את המחלה אף הם באופן מובהק (טבלה 5.1). לא התפתחה מחלה משמעותית בגל הגידול והקטיף השני ולכן תוצאות היבול המובאות להלן מתיחסות בעיקר לגל הראשון ולגל השני.

לחווות גבוהה יותר בלילה נמדדה בטיפול האיזורר על קרקע חשופה בעוד ביום נמצאה לחווות נמוכה יותר בטיפול האיזורר על גבי קרקע חשופה וגלויה (ציפור 1.5). טמפרטורות גבוהות יותר ביום נצפו בחלוקת החיפוי (ציפור 1.5). בעונה זו הוצבו בחממות קוראי נטונים נוספים שմدد את רטיבות העליה ביום ובלילה במשך כל הניסוי. טיפול האיזורר גרמו לעלייה ברטיבות העליה בלילה בחלוקת לא מחופות, לעומת זאת בחלוקת מחופות הזורמות האזורי הפחתה את רטיבות העליה בהשוואה לשאר הטיפולים (ציפור 5.2).

יבול פרחים רב יותר בغال הראשון נתקבל בחלוקת חיפוי הקרקע, האיזורר והטיפול הכימי בסויז' (טבלה 5.2). אורך הפרחים לא הושפע על ידי טיפול הנייסוי (טבלה 5.2). מספר הפוקעים בכל פרח היה רב יותר בטיפול החיפוי והאייזורר המאולץ והוא הפחתה בעוד שני הגורמים האחרים לא נמצאה השפעה לטיפולים (טבלה 5.2). כמוות בשוואה לטיפול הקרקע החשופה בעוד שני הגורמים האחרים לא נמצאה השפעה לטיפולים (טבלה 5.2). הפרחים בغال השני הייתה רבה יותר בטיפול חיפוי הקרקע בהשוואה לקרקע לא מחופה והיתה גבוהה יותר בטיפול הסויז' בהשוואה להיקש הלא מרוסט ולמיתוס (טבלה 5.2). שעור פרחים בغال הראשון ביחס לכל הפרחים שנקטפו במהלך העונה נתקבל בטיפולים ללא חיפוי. בغال הראשון הקדימו לפרק חלוקות החיפוי בהשוואה בחלוקת ללא חיפוי ובמידה רבה יותר החלקות המחופות שאיזורר. שעור הפרחים שהקדימו לפרוח בغال השני היה גבוה יותר בחלוקת החיפוי (טבלה 5.3).

השפטת חיפוי קרקע ומספר השורות בערוגה על תחלאות לייזיאנטוס בעובש אפור (ניסוי במנחרות עיריות, חוץ הבשור 2007 2008). הניסוי נשתל ב- 7.9.07 בעומד שטילה של 70 צמחים למ"ר בארבע מנהרות עיריות. הטיפול הראשי במנחרות אלה היה חיפוי קרקע (מנחרות עם חיפוי קרקע ומנחרות ללא חיפוי קרקע) והשתילה נעשתה בחוררים גדולים שנקרוו בפוליאתילן של החיפוי. טיפול שני ניסוי בניסוי היה מתכונת השטילה; השטילה נעשתה בשתי מתכונות, האחת ב- 6 שורות לערוגה והשנייה ב- 4 שורות לערוגה בכל המנהרות. ניסויו היו שני זנים אך לא ניתן להשוות ביניהם בגל מיקום שלא הוגרל. הזון ABC כחול מוקם בחלק הקדמי של המנהרות שהיא קרוב לפתחים בעוד הזון ABC רוז מוקם בחלק המנחרה הרחוק מהפתח (נספח 6).

במנחרות הניסוי התפתחה בתחילת הניסוי חום רב ולכך היה צורך להשאירו פתוחות. הותרת הפתוח הדромוי לא רשות חרקים הביאה לכך שכינמת עש הטבק תדרה למבנים ווירוס TMV תקף צמחים במבנים. מצאנו שחיפוי הקרקע השפיע על תחלאות צמחי הליזיאנטוס. החומרה של תחלאות צמחים בחלוקת לא מחופות הגיעו לכדי כ- 65% בעוד בחלוקת מחופות החומרה הגיעו לכדי כ- 10% (צירוף 6.1).

התפתחות עובש אפור בטיפוליים העורכה במהלך הגל הראשון. תחלאה רבה יותר לעין ערוץ נצפה בזון ABC רוז בהשוואה לzon ABC כחול (צירוף וטבלה 6). אך לא ניתן לייחס את ההבדל לריגושים שונים אלא למיקום הזנים במנחרות, ככלומר בחלוקת הפנימיות (ABC רוז) התפתחה מחלת חמורה יותר בגל אוורור לקוי יחסית בחלוקת הקרובות לפתח המנחרה (ABC כחול). בזון ABC כחול נתקבלה שכיחות מחלת גבואה יותר בטיפולי חיפוי קרקע (צירוף וטבלה 6). אך יש לציין כי בניסוי זה חורי השטילה היו גדולים. בזון ABC רוז לא נמצא הבדל מובהק בין טיפול חיפוי (צירוף וטבלה 6.2). שני הזנים נמצאו ששכיחות המחלת הופחתה על ידי סיידור הצמחים ב- 6 שורות בחלוקת בהשוואה לטידור הצמחים ב- 4 שורות בחלוקת (צירוף וטבלה 6.2). לפיכך, פיזור הצמחים בחלוקת ודילולם בשורה הפחתת את התחלואה.

כמות הפרחים בגל הראשון בזון ABC כחול הייתה גבוהה יותר בחלוקת החיפוי וمبין חלוקות אלה היא הייתה גבוהה יותר במתכונת השטילה של 4 שורות לערוגה. בחלוקת החיפוי הופעה גם מחלת רבה, כנראה בגל היבול הרב יותר וצפיפות הנוף. בזון ABC רוז נתקבלו יותר כבדים יותר וב的日子里 פקיים רבים יותר בחלוקת החיפוי, תוצאות אלה לא נתקבלו בזון ABC כחול נתקבלו פרחים ארוכים יותר, כבדים יותר וב的日子里 פקיים רבים יותר בחלוקת החיפוי, תוצאות אלה לא נתקבלו בזון ABC שני (טבלה 6.3). בגל הפריחה השני התקבלו פחות פרחים בחלוקת ללא חיפוי שנשנה במתכונת 4 שורות בערוגה בהשוואה לשטילת 6 שורות בערוגה בשני הזנים. מספר הפעמוניים לא הושפע מטיפול חיפוי וממתכונות השטילה. משקל הפרחים היה גבוה יותר בטיפול החיפוי בזון ABC כחול ובזון השני הופחת במתכונת 4 שורות בהשוואה למתכונת 6 שורות בחלוקת החיפוי (טבלה 6.3).

7.11.07 חיפוי קרקע, אוורור בתוך השורות, גודל חור השטילה ביריעת החיפוי והסרת עליים תחתונים (ניסוי חמות עונת 2008) בעונת 2007 2008 נערך ניסוי בשתי חמות בחותם הבשר (מועד שטילה 6.9.08 וzon ABC כחול) בו נבדקו טיפול חיפוי קרקע, אוורור בין השורות באמצעות צינור מחורר (במשטור של 10 דקוט איוורור ו-10 דקוט הפסקה בין השעות 17:00 ל- 08:00, החל מ- 15.11.07), טיפול כימי באטלנטציה (נספח 7) ושילוביהם. בנוסף, טיפול חיפוי קרקע נלמד נושא גודל החור הנקרע ביריעה – חור גדול (מלבן בגודל 3*15 ס"מ) כפי שבוצע בשני ניסויים אחרונים או גודל חור קטן (עיגול בקוטר של כ- 2.5 ס"מ) כפי שנעשה בניסויים הראשונים. הטיפול הכימי ניתן בריסוס לכל הנוף או ממוקד לכיוון הגדים ובבסיסי הגבעול. כמו כן היה טיפול נוספים של הסרת עליים תחתונים הקרובים לקרקע ב- 1.11 אשר הושלים ב-

7.11.07. התוצאות מובאות בספח 7.

לאחר גל הפריחה הראשון נמצאה שהמחלה בגדמים הופחתה על ידי הסרת עליים (אך גידול הצמחים לאחר הקטיף סבל), טיפולים כימיים היו יעילים אך יישום לגדים לא שיפר זאת. שילוב טיפולים כימיים עם אמצעים אחרים לא שיפר את הפעולות. אוורור בתוך הערוגה הפחתת את שכיחות המחלת אך לא נתקבל שיפור בטיפוליים בהם נעשה שילוב עם אמצעים אחרים. חיפוי קרקע הפחתת מחלת ובהשואת גודל החור נמצאה שchor שטילה קטן יותר הביא להפחחתת מחלת רבה יותר. טיפול כימי רגיל שניתן בחלוקת מחופות קרקע לא שיפר את ההדבירה בהשוואה לחיפוי בלבד. חיפוי קרקע וקריעת חור שטילה קטן היו יעילים כמו לבדו. טיפול חיפוי עם חורים קטנים לשטילה משולב עם טיפול כימי מכון שיפר את יעילות ההדבירה בהשוואה לכל טיפול בנפרד (צירוף וטבלה 6).

בגל הפריחה הראשון נתקבלו יותר פרחים רק בטיפול האוורור עם הסרת עלים תחתוניים ואורך הפרחים לא השפע מהטיפולים. מספר הפקעים לפרק היה גבוהה יותר בטיפולו הריסוס הכימי ללא ועם אוורור ובכל טיפול הchipovi (צירור בטבלה 6.1) ומשקל הפרחים היה גבוה בכל הטיפולים יחסית להיקש ולטיפול הסרת העלים בלבד (צירור בטבלה 6.6). בgal הראשון הקדימו לפרוח הצמחים בחלקות האוורור, אוורור עם הסרת עלים ואורור עם כימי לגדים, chipovi עם חור קטן או גודל וחיפוי עם כימי. שער פרחים גבוה בגאל הראשון יחסית לכל גאל השנתי נזדbul בטיפול אוורור עם הסרת עלים.

פריחה מוקדמת בגאל השני התקבלה בטיפולים כימי עם הסרת עלים, כימי לגדים וכיימי לגדים עם chipovi (טבלה 7.7).

בגל הפריחה השני התפתחה מחלת בסיסי הגבעול של צמחים שלמים. את המחלת הפחיתה טיפול הchipovi הסרת עלים, ריסוס כימי וריסוס כימי לבסיסי הגבעול אשר היה טוב מהטיפול הכימי. שילוב של הסרת עלים וטיפול כימי לא נמצא טוב מכל טיפול הנפרד. טיפול אוורור הפחתת אף הוא את המחלת ותוספת הסרת עלים לאוורור שיפרה את ההדבורה יחסית לכל אחד מטיפולים אלה בנפרד לעומת השילוב של יישום כימי עם האוורור לא שיפר את ההדבורה גורם הדבורה בנפרד. chipovi קרע עם חור שתילה גדול הפחתת מעט את המחלת בעוד chipovi הקרע עם חורי שתילה קטנים הפחתת את המחלת במידה רבה. שילוב chipovi קרע עם טיפול כימי לא נמצא יותר מכל גורם בנפרד. chipovi קרע עם חור גדול ועם חור קטן משולבים עם טיפול כימי היוו מיל גורם בנפרד. טיפול כימי לא הוסיף על

הטיפול המשולב של אוורור וחיפוי (טבלה 6.2).

בגל הפריחה השני נתקבלו יותר פרחים בטיפולים הכימיים הרגיל וזה שכונן לבסיסי הגבעול, בטיפול הchipovi הרגיל בחלקות המאוחרות ובחלקות המחופות וזאת בהשוואה להיקש לא מטופל (טבלה 7.2). נמדדו פרחים ארוכים יותר בחלקות שהטיפול בהן היה chipovi קרע, chipovi קרע עם חור שתילה קטנה מטיפול הchipovi הסרת עלים בלבד, chipovi רגיל עם גודל גנייל (טבלה 7.2). מספר פקעים רב יותר התקבל ברוב הטיפולים חזק טיפול הchipovi הסרת עלים לבדים, ריסוס כימי לגדים, chipovi לבדים וchipovi עם טיפול כימי רגיל (טבלה 7.2). משקל הפרחה הבוגר גדול בטיפולי הסרת עלים וכיימי רגיל לבדים, אוורור ואורור עם הסרת עלים, אוורור עם כימי רגיל וזה שכונן לבסיסי הגבעול, chipovi וחיפוי עם טיפול כימי וכל הטיפולים ששילבו אוורור וחיפוי קרע (טבלה 7.2).

הישרדות מדבק בשטח לאחר הגידול. לאחר וקשיונות בוטרייטיס נוצרים בליזיאנטוס נגוע, יתרן והם שורדים בחלקות נגועות. למרבה הפלא בקייז 2005 לא הצליחו לקבל קשיונות ברקמה צמחית של ליזיאנטוס מודבק למרות המכמתה הגדולה של צמחים שאספנו, הדבקנו והציגנו. לפיכך החלנו ליצור את הקשיונות בתרכיבת. קשיונות של שני תבניות בוטרייטיס וקטעי גבעול מאוכלסים בקוררי הפטיריה נטמנו בקרע בחותות הבשר (נספח 8). הקשיונות והתפтир בקטעי הגבעול שהועברו למעבדה לגידול על מצע מזון נשמרו חיוניים עד חודש אוקטובר 2006. מדבק דומה נתמן בקרע לפני חיטויים שנעשו בחותות הבשר ובתchanת זהר בכיכר סדום. אדיגן + קוונדור המית את כל מדבק הקשיונות בחותות הבשר אך לא את הבוטרייטיס החובי בקטעי גבעול. מתיל ברומיד נמצא פחות על בהדבורה הקשיונות. בוטרייטיס בקטעי גבעול שרד חלקית גם בכיכר סדום חיטויי קרע במתייל ברומיד, חיטוי סולרי, תלודריף ואדיגן. הקשיונות שרדו בשיעור מועט בכיכר סדום גם ללא החיטויים (צירורים 1.8).

דיון

בגידול הליזיאנטוס בחורף מקובלים שני גלי פריחה. בגאל הראשון צומח ענף מרכזי אחד נושא תפוחת. בתום הקטיף של gal הראשון נוצרים גדים קטנים קצריים אשר מצמיחים מספר ענפים צדדיים שנkeptים עם פריחתם בגאל השני. מחלת העובש האפור הנגרמת על ידי פטריריה *cinerea*. מהוות אחד המפגעים העיקריים לצמח ליזיאנטוס. הפטיריה פוגעת בגדים לאחר קטיף, בצוואר השורש ובבסיס הגבעול גם בהעדר מצע קטיף וזה יכול להביא לתמותת הצמח כולו. נגינות בסיסי הגבעול היא הצורה החמורה והנפוצה ביותר של מגפת העובש האפור. עבודה זו עסקה בלימוד ההדבקה בגבעול ותנאים המשפיעים על הופעת המחלת בסיסי הגבעול, כמו כן נבחנו אמצעי מניעה והדבורה כנדג' מחלת העובש האפור.

בתחילת המחקר בוססה מערכת הדבקה בגדים גבעול ובקטעי גבעול מנוקטים המאפשרת סריקת תנאים ואמצעים רבים למידת השפעתם על התפתחות הריקבול או ההנבגה שבאה בעקבותיו. אופן ההדבקה בוטרייטיס עשוי להשנות בהתאם לגידול ולאייר (Neill *et al.*, 1997; Sarabani *et al.*, 1999). התפתחות הריקבול בגדים גבעול נגועים אינו תלוי בצורת ההדבקה. מרותה שהדבקה בתרחיף הנגנים הינה מהירה יותר בהתחלה היא לא נבדלה מיותר

אופני הדבקה בסוף הניסוי. תוצאות דומות התקבלו בצמחים העגבנייה (Neill *et al.*, 1997). עם זאת החדבקה בתרחיף הנגנים הגבירה את עוצמת ההנגבגה בהשוואה לשיטות הדבקה האחרות, דבר המעיד על התפתחות מהירה יותר של המחללה. לאחר ופטריות הבוטרייטיס פוגעת בצמחים הליזיאנטוס בסיס הגבעול נבדקה האפשרות כי ריגישות הגבעול משתנה עם הגובה. נמצא שקטעי גבעול מהפרקים האמצעיים (3-5) היו רגישיים יותר למחללה מאשר הפרקים הנמוכים (2-1) ועוצמת ההנגבגה הייתה גבוהה יותר בפרק 4, לעומת הפרקים האמצעיים ולא התוצאות הראהו כי רגישיים ביותר מ בין פרקי הגבעול. כתוצאה החותך לא הייתה השפעה משמעותית על התפתחות הרקבון, אך עוצמת ההנגבגה הייתה גבוהה יותר בגדמים עם צורת חתך אלכסוני. כמו כן נמצא נוסף כי הפרקים 4-3 היו יותר רגישיים למחללה מאשר

פרק 2 מה שמחזק את הטענה כי הפרקים האמצעיים הם הרגישיים ביותר.

התפתחות מחללה תלולה בשלושה גורמים עיקריים: פטוגן אינפקטיבי, פונדקאי, רגיש ותנאי סביבה. המתאיםים להתפתחות המחללה. פטריות *B. cinerea* היא בין הפטריות הדורשות לחות יחסית גבוהה להתקפותה. נבחנה השפעה של הטמפרטורה, הלחות היחסית והשפעת הגומלין שלחן על הופעת המחללה בצמחים הליזיאנטוס. כפי שתואר בחמשן, התנאים להתקפות המחללה בקטעי גבעול היו שונים מאוד שנמצאו בצמחים שלמים. בשנים האחרונות יש חשיבות רבה לתופעת הדבקה הישירה של פצעי הגבעול (Neill *et al.*, 1997) והתנאים המיטביים לדבקה הם 80% לחות יחסית. לחות נמוכה ותנאי יובש, המתבטאים בטמפרטורות גבוהות, יכולים להגבר את הנגיעה בקטעי הגבעול. תנאי הדבקה אלו נמצאו כמייטביים בצמחים בזיל (Neill *et al.*, 1999), (Sharabani *et al.*, 1999), צמחים העגבנייה (Neill *et al.*, 1997). גם בצמחים הליזיאנטוס נמצא כי לחות יחסית נמוכה (65-75%) ובטמפרטורה גבוהה (29 מ'ץ) קצב התקפות המחללה היה מהיר, אבל קצב התקפות המחללה המרבי בלחויות אלו היה בטמפרטורה של 15 מ'ץ. בלחות יחסית מעל 85% קצב התקדמות המחללה המרבי היה בטמפרטורה של 25 מ'ץ לעומת 12-15 מ'ץ המחללה התקיפה מהר. התקדמות דומות נצפו בטמפרטורה של 18 מ'ץ לעומת 12-15 מ'ץ בטמפרטורה האפור (Van den Berg *et al.*, 1981) מצאו כי התנאים המיטביים להתקפות העובש האפור הם בטמפרטורה של 20 מ'ץ ולחות יחסית מעל 93%. להופעת הנגנים בקטעי גבעול בצמחים הליזיאנטוס נדרש לחות יחסית מעל 85% בטמפרטורה של 15-18 מ'ץ. בלחות יחסית נמוכה (65-85%) קצב ההנגבגה היה איטי מאוד אך ניתן שהדרגה ממושכת יותר היו מופיעים נגנים. תוצאות דומות נצפו בצמחים העגבנייה (Neill *et al.*, 1997), בקטעי גבעול אשר היו בתנאי לחות יחסית נמוכה ההנגבגה הופעה יותר מאוחר מאשר בקטעי גבעול אשר היו בתנאי לחות יחסית גבוהה.

השפעת הטמפרטורה בצמחים שלמים נצפתה רק בלחות יחסית נמוכה (75-85%), המחללה התקופה מהר יותר בטמפרטורת 22 מ'ץ לעומת 18 מ'ץ. לעומת זאת בטמפרטורת 18 ו-26 מ'ץ, אף על פי שהטמפרטורה האופטימלית להתקפות המחללה בלחויות יחסיות נמוכות היא 22 מ'ץ. בלחות יחסית מעל 85% לא היו הבדלים בהתקפות המחללה בכל הטמפרטורות (18, 22, 26), לפיכך, התקפות המחללה אינה מוגבלת על ידי טמפרטורה כאשר יש תנאי לחות יחסית גבוהה. הופעת הנגנים על גבי הרקמה הצמחית נצפתה רק בלחות יחסית מעל 99% ללא הבדלים משמעותיים בין הטמפרטורות. בניסוי זה נמצא כי לטמפרטורה ולחות היחסית יש השפעה מובהקת על התקדמות המחללה בצמחים שלמים אך ללא השפעת הגומלין ביניהם. בנוסף קיימת השפעת הטמפרטורה על קצב התקדמות המחללה והשפעת לחות היחסית על קצב ההנגבגה. בצמחים הליזיאנטוס התנאים להתקפות המחללה הם דומים כמו ברוב הגידולים אך המחללה יכולה להתפתח גם בלחות יחסית נמוכה ובטמפרטורות יחסית נמוכות.

צמח ליזיאנטוס מפתח שושנת עלים סמוך לקרקע. עקב קרבתם לקרקע וצפיפותם נוצרים תנאים מיקרואקלים מיטביים להדבקה בבוטרייטיס. נמצא שהעלים התוחtones הסמכיים לקרקע (שושנת עלים) רגישיים יותר מהעלים העליונים. רגישותם של העלים התוחtones ותנאי הסביבה המיטביים גורמים להדבקה והתקדמות מהירה של המחללה לאורך העלה. הפטיריה מתקדמת לאורך העלה הנגוע עד הגבעול וגורמת לנגיעתו החמורה. בטמפרטורות 18 ו-22 מ'ץ ולחות יחסית מעל 95% היו מיטביים להתקדמות המחללה יותר בטמפרטורה גבוהה (26 מ'ץ) ולחות יחסית מתחת ל-95%. פרישת ירידת פוליאטילן כחיץ בין העלים התוחtones לקרקע וטובה הביאה להפחחת נגיעות בבוטרייטיס בעלים התוחtones. בעבר שימוש ביריעת פוליאטילן כחיפוי לקרקע נמצא יעיל בהפחחת מחללת העובש האפור (Elad, 1998, 2000) ולאחר מכן להפחחת מחללת הכימשון (שאוחבת לחות) בעגבנייה (שטיינברג וחוב, 2004). בצמחים הליזיאנטוס ירידת פוליאטילן שמשה לא רק לבקרת האקלים מבנה אלא גם כחיץ בין העלים התוחtones לקרקע וטובה.

אופי הצימוח של זני הליזיאנטוס יכול להשפיע על רגישותם למחלה עובש אפור. זנים בעלי צימוח רב יותר יוצרים נוף צפוף יותר וכן נוצרים תנאים מיקרואקלים מתאימים יותר להתקפות המחלה. בבדיקה רגשות של שני זני ליזיאנטוס "אקו שמפניין" וקטלינה צחוב" נמצא כי רגשותם תלויות בסוג האיבר המודבק. (Neill *et al.* 1997) מצאו לאיברים השונים יש רגשות שונות לבוטרייטיס בעגבניה. קטעי גבעול של צמחי הליזיאנטוס מזון "קטלינה צחוב" מצאו רגשים יותר מזון "אקו שמפניין", אך עליים תחתונים שנלקחו מזון "אקו שמפניין" מצאו רגשים יותר. מחקרים מסוימים דוחות כי הזון "אקו שמפניין" הוא רגש ביותר. יתרון והסיבה לרגשותו לעובש האפור היא רגשות העליים תחתונים לבוטרייטיס. כפי שמוסבר לעיל נגיעה של העליים התחתונים לבוטרייטיס יכולה להוביל לנגיעה בגבעול ולתמותת הצמח כולה. עקב אופי הצימוח הצפוף וסבוך של צמחי הליזיאנטוס, עוצמת האור בקרבת הקרקע (עוצמת אור ומוקה) היא שונה מעוצמת האור בנו"ף העליון (עוצמת אור גבוהה). עוצמת אור נמוכה הייתה השפעה על התקפות נמוכה) היא שונה מעוצמת האור בנו"ף העליון (עוצמת אור גבוהה). עוצמת אור נמוכה הייתה השפעה על התקפות המחלה.

בניא גרווה מואוד לפיריד החדרמות הבוטרייטיס ביו הצמחים היא לטוח קצר במהלך העונה. באזור הנגב המערבי היא 80-87 למי' ולאחר שהצמחים גדלים מותפתח נוף צפוף ולכן הסבירות להידוקות מצמח שכן מהעלים המזוקנים. בנוסף נפתחה הדבקה של העלה מעלה שכן נגוע. ציפויות צמחי הליזיאנטוס בחלקות מסחריות תרמו לכך. בקרבת הקרקע המתאיםים להתפתחות המחלת הנטענים נוצר רקבון המתකם לעבר בסיס הגבעול הגורם לתהוות חמורה בגבעולים בծמחים שלמים ובגדמים שנוצרו לאחר הקטיף, כך שהדבקת הגבעול אינה רק ישירה אלא גם תרמו לכך להידוקות מצמח שכן נגוע.

ב托ם קטיף גל ראשון של צמחי הליזיאנטוס נוצרים גדים עם פצע פתוח עשוי להדבק ישירות על ידי הנגנים שמנצאים האוורור. גדים טריים, הנוצרים ישר לאחר הקטיף, רגשים מאוד להדבקה על ידי פטרית הבוטרייטיס, רגישותם מוחתת עם הגדלות הפצע, נביות הנגנים וחידרת נחשון הנבייטה לתוך הרקמה הצמחית כפי שהוזכרם בגבעולי בזיל ועגבניה (Neill *et al.*, 1997; Sharabani *et al.*, 1999). נגיעה חמורה נפתחה בהדבקת גדים גבעול של העגבניה עם פצע טרי הנוצר לאחר חיתוך הגבעול (9 שעות זמן החיתוך) גם בהדבקה עם תרחיף נגנים וגם בהדבקה עם נגנים יבשים. בהדבקת הפצע יום אחד לאחר חיתוך הייתה ירידה משמעותית בחומרת הנגיעה (Neill *et al.*, 1997). Sharabani *et al.* (1999) דיווחו על תופעה דומה בצמחים בזיל. בצלומי מיקרוסקופ אלקטرونים סורק הם רוא כי 6 שעות לאחר חיתוך הגבעול הייתה חדירה מהירה מאוד של נחשון הנבייטה לתוך הרקמה הצמחית, 24 שעות לאחר חיתוך החלה להיווצר שכבה אוטומת על פני הפצע הנוצר שעיכבה את חידרת נחשון הנבייטה של הנג'ג לתוך הרקמה הצמחית. חמישה ימים לאחר חיתוך הגבעול לא הייתה חדירה כלל של נחשון הנבייטה עקב כיסוי מלא של הפצע על ידי שכבה אוטומת אשר מנעה לחלוטין את תהליכי ההדבקה. מכז נובע כי גדים גבעול רגשים להדבקות של פטרית הבוטרייטיס במשך תקופה קצרה. נגנים רבים נוצרים בסיס הגבעול ועל גבי הגדים שנוצרים לאחר הקטיף וכן הם מהווים את המזדקב העיסורי אשר מופץ באוויר.

תכשיiri הדבכה הינס אמצעי חשוב להדברות מחלות צמחים. יישום תכשיiri הדבכה לפני ההדבקה בבטוריטיס עשוי למנוע את התפתחותן של מחלות עובש אפור. ריסוס הסידן על פני העלווה של הצמחים יכול גם להפחית הדבקות בטוריטיס, כמו במקרה של צמחי רוסקוס (Elad and Kirshner, 1992). יישום הסידן על פני העלווה בצמחי רוסקוס הפחתת בוצרה משמעותית את התפתחות מחלת עובש אפור לאחר הקטיף. בליזיאנטוס, כל תכשיiri הדבכה היו יעילים בתנאים מבוקרים כאשר רוסקו לפניו ואחרי ההדבקה בטוריטיס על גבי עלים מנוטקים. ריסוס הסידן על פני העלווה הפחתת המחלת רק כאשר רוסס לפניו הדבכה ולא כאשר רוסס אחריה הדבכה. כמו כן ריסוס הסידן על גבי קטעי הגבעול לא הפחתת כלל את התפתחות הרקבון וגם את ההנגנה. נראה כי טיפול הסידן יעילים רק כאשר הם מיושמים על גבי העלווה ולפני הדבכה בטוריטיס. תכשיירים כימיים כמו מיתוס, סויז'י ורובראל היו היעילים ביותר בהפחנת המחלת, לעומת תכשיירים כמו טלדור, פולאר וסילבדור אשר היו פחות יעילים בהפחנת המחלת. עצמת ההנגנה הייתה נמוכה בכל הטיפולים הכימיים. רוב התכשיירים הכימיים מיושמים בשטח בריסוס. מחלת העובש האפור בצמחי ליזיאנטוס מתפתחת בעיקר בסיס הגבעול. הנוף הצפוף של צמחי ליזיאנטוס מנסה על התכשיירים הכימיים להגיע

לבסיס הגבעול ולכון יעילותם עשויה להפוגם. יישום תכשירים כימיים בהגעה יכול לפתור את הבעיה הזאת. מיתוס בשני המינונים נמצא יעל ביותר וטלאור פחות יעל בהגעה בתנאים מבוקרים ולא בשדה.

הרכב החדש עשוי להשפיע על רגישות הצמחים למחלות (Yermiyahu *et al.*, 2006). השפעת מקור החנקן הינה ייחודית למין הצמח ולתנאי גידלו. ריכוז גובה של חנקן גורם לעלייה בעוצמת המחלה בצמחים בזיל (Hobbs and Waters, 1964; Elad *et al.*, 1993). לעומת זאת נמצא תוצאות הפוכות בפרחי החרציות שגדלו באותה התנאים (Bar-Tal *et al.*, 2001). לעומת זאת נמצא תוצאות הפוכות בפרחי החרציות שגדלו באותה התנאים (Yermiyahu *et al.*, 2006). לעומת זאת נמצא תוצאות הפוכות בפרחי החרציות שגדלו באותה התנאים (Elad *et al.*, 1993). בעובדה זאת, תוספת של ריכוז גובה של חנקן בדשן לא הפחתה כלל את המחלה בצמחים שלמים ובkulua היא אפילו הגבירה את המחלה. סידן בצמחים הליזיאנטוס לא הפחתה כלל את המחלה בצמחים שלמים ובkulua היא אפילו הגבירה את המחלה. תוספת סידן מי השקיה הפחתה את הנגיעות בבוטריטיס בגידולים רבים לפני ואחרי הקטיף (Volpin and Elad, 1991; Bar-Tal *et al.*, 2001; Elad and Volpin, 1993). סידן הוא אחד המרכיבים החשובים במלת הביניים אשר מותקפת על ידי הפטירה. יוני הסידן אחראים על חיזוק המمبرנות הצמחיות וכן תוספת של סידן יכולה לחזק את דפנות של תא הרקמה הצמחית ולהקשות על הפטירה את פרוקת. הוספת סידן למערכת הדישון בצמחים ליזיאנטוס לא הפחתה כלל את המחלה בהשוואה לטיפולים הכימיים. אך עדין רמת הנגיעות הייתה נמוכה מצמחים אשר קיבלו רק טיפול דשן ללא סידן.

הפטירה יכולה לשרוד בקרקע במשך זמן רב בעיקר כתוצאה מכך הנגעים ופחות כתוצאה מכך. חומר צמחי מגע אשר נשאר בשטח יכול להיות מקור נגיעות ראשוני בעונת גידול חדשה. סנטיציה (הוצאה שאריות צמחים מהחומרה) היא אחת השימושות למניעת הנגיעות בבוטריטיס, אך עדין החקלאים נהגים לחטא את החלקות בתכשירים כימיים לפני שתילה חדשה. בעבר היה נהוג לעשות חיטוי קרקע עם תכשiri מתיל ברומיד, אך עקב איסור שימוש בו נעשים ניסויים למצוא תכשירים חלופיים כימיים אדיגן וקונדור היהiesel בהפחיתה חיוניות הפטירה לא פחות מחייב קרקע במetail ברומיד. בנסיוי שנערך בתקנת זהר חיטוי קרקע בתכשירים כמו אדיגן וטלודריפ היו גם כן יעילים בהפחיתה חיוניות הפטירה שנשמרה בקרקע אך עדין חיטוי קרקע במetail ברומיד היהיעיל יותר. בנוסף, טיפול של חיטוי סולרי בלבד הפחתה את חיוניות הפטירה בדומה לתכשירים הכימיים.

התפתחות מחלה עובש אפור בצמחים חממה היא בעיקר בחורף עקב נוכחות רבה של לחות גבוהה. מאחר ולהות גבוהה או מים חופשיים הם הגורם המוביל להתפתחות המחלה, הפחתת הלחות בחממה יכולה להפחית את הנגיעות הצמחים בבוטריטיס: אמצעי הדבירה אגרוטכניים כמו איירורו נס' הגידול, חיפוי קרקע, סוג ההשקייה, ציפוי השטילה ודישון מוגבר בסידן נבדקו בעובדה זאת באמצעות הנגיעות בבוטריטיס וחולקס נמצאו יעילים. שילוב של אמצעים אלו או שילובם עם טיפולים כימיים יכול לסתור הפחתה תוספתית של המחלה.

בעונת גידול 5/2004 נבדקו שני אמצעי הדבירה קולטורליים להפחיתה הלחות בנס' הגידול. טיפול טמוני בתוד הערגות וחיפוי קרקע בחממה והשילוב של שני טיפולים אלו נמצאו מאוד יעילים בהפחיתה נגיעות הצמחים בבוטריטיס. בעבר חיפוי קרקע בחממות נמצא יעיל בהפחיתה מחלת עובש אפור (Elad, 1998, 2000) ומחלת הכימשו בעגבניה (שטיינברג וחובי, 2004). בחממות עם חיפוי קרקע המחלות התפתחו מאוחר יותר וחומרת המחלה הייתה נמוכה יותר. משך הרטיבות של העלים בחממות עם חיפוי קרקע במהלך הלילה היה קצר יותר מאשר בחממות עם קרקע חסופה. החיפוי בפוליאתילן גורם לעלייה של טמפרטורת הקרקע במשך היום. החום הנפלט מהקרקע בחממות עם חיפוי קרקע משנה את טמפרטורת הצמחים במשך הלילה ובכך את נקודת הטל. עקב כך נזנחה המועד בו מתעבים מים על העלה, משך זמן בו העלה רטובה מותקצר ונמנעת התפתחות המחלות או הדרות לחות (שטיינברג וחובי 2004). בנוסף, רירעת פוליאתילן משמשת כחץ מפריד בין קרקע רטובה לעליים תחתונים ובכך נמנעת התפתחות מחלת העובש האפור. בעונת גידול 6/2005 חיפוי קרקע גם נמצא יעיל בהפחיתה מחלת עובש אפור אך דישון מוגבר בסידן לא השפיע כלל על הפחתה המחלה. לעומת זאת תוספת של סידן במים השקיה הפחתה את הנגיעות בבוטריטיס בצמחים ורד (Bar-Tal *et al.*, 2001) ובצמחים בזיל (Yermiyahu *et al.*, 2006). כמו כן ריסוס בסידן על גבי העלה של צמחי רוסקוס (Elad and Kirshner, 1992) הפחת את נגיעות הצמחים בבוטריטיס. נראה כי בצמחים הליזיאנטוס תוספת של סידן או ריסוס של סידן אינם משפיעים על מחלת עובש אפור די הצורך.

שינויים בCAPEOT השטילה משפיעים על המיקרואקלים בתוך הצמחייה. ההפחתה צפיפות השטילים יכולה להפחית את הנגיעות בבוטריטיס. למתכונת השטילה יש השפעה ישירה על צפיפות הפונדקאים הזמינים לפתוגן וגם השפעה על גרדיננט פיזור הנבגים. בחלוקת צפיפות יותר נמצאה נגיעה מוגברת (Legard *et al.*, 2000; Tolinger and Strider, 1984). בנוסף נמצאים שינויי מיקרואקלים כמו לחותיחסית נמוכה והפתחה במשך זמן רטיבית העולה בחלוקת לא צפיפות (Legard *et al.*, 2000). ב策מי לייזיאנטוס בעומד השטילה הצפוף רמת המחללה הייתה גבוהה מעומד השטילה המדולל בתום קטיף גל ראשון. לאחר חישוב אחוז צמחים בריאים התברר כי בעומד המדולל היה אחוז צמחים בריאים גבוה יותר. כמו כן מספר הגדים הבריאים היה גבוה יותר בעומד הצפוף אך אחוזם היה דומה בשני העודדים. כאשר גבואה יותר. גבואה גם מספר הגדים הבריאים היה גבוה יותר בעומד הצפוף מספרם היה גבוה יותר. הסיבה לכך היא ההבדל במספר נספרו מספר צמחים בריאים שנשארו בחממה, בעומד הצפוף מספרם היה גבוה יותר. במספר שנותלו 50 צמחים למ"ר. למורות שרמת הצמחים שנשתלו מהתחלה. בעומד הצפוף נשתו 70 צמחים למ"ר ובעומד מדולל נשתו 50 צמחים למ"ר. ככלומר, עומד המחללה הייתה גבוהה יותר בחלוקת עם העומד הצפוף עדין שנארו בהן מספר גדויל יותר של צמחים בריאים. ככלומר, עומד השטילה מפחית את רמת הנגיעות של הצמחים אך עדין אין רוחוי מבחינת יבול הפרחים. חשיבות מספר הצמחים והגדמים הבריאים שנשארים לאחר הקטיף של הגל הראשון היא גדולה. בתחלת הגדול מייצר צמח הליזיאנטוס גבעול מרכזי אחד אשר מייצר פריחה מסימת ופריחה על הסטעפויות של הגבעול. לאחר קטיף הגבעול המרכזי נוצרים מספר גבעולים צדדיים ובכך נוסף יכול פרחים בגידול גל שני.

עומד השטילה יכול גם להשפיע גם על יעילות תכשורי הדבורה. ישום תכשורי הדבורה יעל יותר בחלוקת ולא צפיפות (Legard *et al.*, 2000). בעובודה זאת בנוסך לשינויים בעומד השטילה נעשו טיפולים כימיים אשר נמצא יעילים בהפחחת המחללה גם בעומד הצפוף וגם בעומד המדולל ללא הבדל משמעותית בין הטיפולים הכימיים עצם.

בעונת הגידול 7/2006 נבדקו שלושה אמצעים להפחחת הלחחות בנוף הגדול ולמנעת התפשטות מחלת עובש אפור. רמת המחללה בעונה זו הייתה נמוכה ולהיפוי קרקע ביריעת פוליאתילן, אשר נמצא יעל בעונות גידול קודמות, לא הייתה השפעה משמעותית על הפחחת המחללה. הירידה בייעילות של חיפוי קרקע נבעה כנראה מיישום שונה של חיפוי קרקע בהשוואה לעונות קודמות. בעונות קודמות של ליזיאנטוס נעשה חור קטן בתוך חיפוי הקרקע, בעונה זאת נעשה חור מלכני גדול למספר שתילים של ליזיאנטוס שלא מנע את מגע העלים התחתונים באדמה הרטובה. במהלך הגדול בעונה זאת נצפו מקרים של נגיעה העלים התחתונים בחלוקת מהוות עקב נגיעהם בקרקע. תופעה זאת מוכיחה כי ליריעה יש תפקיד נוסף והוא חיזם המפרד בין העלים התחתונים לקרקע רטובה.

איוורור של נוף הגדול, אשר הפחית את הלחחות היחסית ואת משך הרטיביות של חלקי הצמח הרגשים (Sarabani *et al.*, 1999; Elad, 2000), נמצא כלא יעל בהפחחת המחללה ב策מי הליזיאנטוס בנייסוי 7-2006. איוורור מאולץ הנינו בתוך הגדול הצפוף עשוי לתורם לשינויי מיקרואקלים בתוך הגדול. בעונת גידול זו נעשה שינוי משמעותי במתכונות השטילה של策מי הליזיאנטוס עקב קיום שרובי מערכת האיוורור בתוך הערוגות. בעונה זו וגם בעונות קודמות נשתו מספר דומה של צמחים למ"ר אך צורת השטילה הייתה שונה. בעונות קודמות הצמחים נשתו 6-7 שורות בערוגה ובעונה זאת הצמחים נשתו 4-5 שורות. שטילה ב-4 שורות כבר מגדילה את איוורור נוף הגדול لكن כנראה לא נצפה ההשפעה של טיפול איוורור המאולץ של הגדול כמו שציפינו.

רישום של תכשירים כימיים (מייטוס וסוטויז') היה יעל בהפחחת המחללה בהשוואה לביקורת ולטיפול המיתוס בהגעה. כמו בעונות גידול קודמות ריסום של תכשירים כימיים היה יעל בהפחחת הנגיעות בבוטריטיס. ישום של מיתוס בהגעה נמצא יעל מאד בנייסוי המעבדה, אך בניסוי חממה לא היה יעל כלל (לא הוכח). ניתן כי יעילות השיטה זאת ירדה עקב בעיות ביחסו של הטיפול הזה.

ערכי המתאים בין רמת המחללה וטמפרטורה נמצאו גבוהים בטמפרטורה מעל 20 מ"ץ. Elad and Yunis (1993) מצאו כי הטמפרטורות השכיחות ביותר בחמותה בארץ הן 10-14 מ"ץ אך קיימות טמפרטורות קיצוניתות יותר מתחת ל-8 מ"ץ ומעלה 30 מ"ץ. טמפרטורות קיצוניתות אלו יכולות לגרום לריגשות יתר של הצמחים למחלות. בעובודה זאת נמצאו ערכי מתאים גבוהים מאוד (מעל 0.95) בטווח טמפרטורות 20-25 מ"ץ. טווח טמפרטורות זה נמצא אופטימלי להפתחות המחללה גם בתנאי המעבדה, שכן ערכי מתאים גבוהים בטמפרטורות אלו אכן מייצגים את השפעת הטמפרטורה על חומרת המחללה בחממה. ערכי מתאים גבוהים נמצאו גם בטווח טמפרטורות 30-40 מ"ץ לקרה

סוף העונה, כלומר בתקופה חמה. בתנאי המعبدה בטמפרטורה של 26 מ'ץ התפתחות המחלה הייתה איטית מאוד. כמו כן, Elad and Yunis (1993) מצאו כי טמפרטורה של 30 מ'ץ גרמה לרגשות יתר (פרהדייספוציזיה) של צמחים מלפפון למחלות העובש האפור. מכך אפשר להסיק כי טווח טמפרטורות 30-40 מ'ץ אינם אופטימלי לתפתחות מחלות העובש האפור וערכי מתחם גובהים התקבלו עקב רגשות של הצמחים לטמפרטורות גבוהות והتبאות של התמונות צמחים בעקבות הפגיעה מבוטרייטיס ופגיעה מעבר המים בנוף.

ערכי מתחם גובהים התקבלו בין רמת המחלה ולחות יחסית גבוהה (100%-90%), זה מעיד על השפעת לחות יחסית גבוהה על התפתחות מחלות עובש אפור. בתנאי המعبدה (סעיף ב') רמת המחלה הייתה גבוהה בלחות יחסית מעל 85%, לעומת זאת בחממה התקבלו ערכי מתחם נמוכים בטוווח לחות יחסית של 90%-80%.

לחיפוי الكرקע ביריעת הפליאתילן הייתה השפעה על לחות יחסית וטמפרטורה במנחרות. הטמפרטורה במנחרות עם חיפוי الكرקע הייתה גבוהה ביום ובלילה לעומת מנהרות ללא חיפוי الكرקע. שטיינברג וחובי (2004) טענו כי חיפוי الكرקע בפליאתילן גורם לעליה של טמפרטורת الكرקע משך היום (יחסית לקרקע חשופה) ולשינויים באורך החום שלנן. החום הנפלט מהקרקע במבנים מחופים משנה את טמפרטורת הצמחים במשך הלילה ובכך את נקודת הטל. עקב לכך נדחה המועד בו מתבאים המים על העלים, משך הזמן בו העלווה רטובה מתCKER וונמעת התפתחות של מחלות אוחדות לחות. לפי נתוני המיקרואקלים שהתקבלו בעבודה זאת נראה כי הטמפרטורה במנחרות מחופות הייתה יותר גבוהה בלילה לעומת מנהרות גם ביום וגם בלילה. שטיינברג וחובי (2004) מצאו כי הסיבה הביוולוגית להחפתת הנגיעות יותר נמוכה במנחרות מחופות גם ביום וגם בלילה. מנגנון (אוחדות לחות יחסית גבוהה) היא ההחפתה בלחות היחסית במהלך הנטה במבנה. נמצא כי רמת המחלה במנחרות בכימישון (אוחדות לחות יחסית גבוהה) נמוכה ממנהרת מרטה המחלה במנחרות לא מחופות. את הממצא הזה אפשר להסביר על ידי שינוי המיקרואקלים שהתקבלו עקב חיפוי الكرקע ביריעת הפליאתילן. בנוסף, חיפוי الكرקע גורם בשנים מהניסויים לתוספת במספר הפקעים לצמח. וגם להקדמת הפריחה.

בעונת גידול 7/2006 חיפוי الكرקע השפיע על טמפרטורה ולחות היחסית בחממות המchapות, למרות שלא היה הבדל ברמת המחלה בחממות אלו. נראה שחוורי שתילה גדולים מדי לא מנעו את מגע העלים בקרקע וכן נגממה עיליות היחסוי. בעונת 08-2007 נמצא שאכן חורים קטנים לשתילה נחוצים למניעת המחלה. בנוסף לטיפול חיפוי الكرקע ניתנו טיפולים האיוורור המאולץ במשך הלילה. בחלוקת בהן היו טיפולים האיוורור המאולץ הייתה ירידת של 5-10% בלחות היחסית גם בחממה מחופה וגם ללא מחופה. Morgan (1984) מצא כי איוורור מאולץ במהלך הלילה הפחתת משמעותית את הנגיעות צמחי העגבניה בבטרייטיס. בנוסף טיפולים האיוורור הפחיתו את רטיבות העלה במלחמות מחופות. השימוש של חיפוי الكرקע עם איוורור מאולץ מפחית משמעותית את משך הרטיבות של העלה במהלך הלילה. בניסויים העיקריים בשנת 08-2007 אושר שחיפוי الكرקע מפחית נגיעה אך חורים גדולים פוגמים ביעילותו. אוורור בתוך השורה הפחתת מחלה אף הוא. המחלה בגדמים הופחתה על ידי הסרת עלים (אך גידול הצמחים לאחר הקטיף סבל), טיפולים כימיים היו יעילים ויישום מכוון לגדים לא שיפר זאת. שילוב טיפולים כימיים עם אמצעים אחרים לא שיפרו את הפעולות. טיפול חיפוי עם חורים קטנים לשתילה מושלב עם טיפול כימי שיפר את יעלות ההזרעה בהשוואה לכל טיפול בלבד בנפרד.

טיפולים הניסויים בבתי צמיחה השפיעו על היבול הנקשרות והן בעקיפין על ידי מניעת בוטרייטיס. בניסוי הראשון (2004) טיפול טיפטוף טמוון וחיפוי הקדים לפרוח והעליה יבול בגל השני. בניסוי החממות בעונת 6/2005/2006 עומד נמו"ק (50 למ"ר) הקדים פריחה בשני הגלים בהשוואה לעמוד צפוף (70 למ"ר). עומד נמו"ק (50 למ"ר) גורם לתוספת במשקל הפרח ומספר פעמוניים בגל הראשון. עומד צפוף (70 למ"ר) גורם ליבול גבוהה יותר בשני הגלים. במנחרות בעונה (2005/6) טיפול חיפוי الكرקע גורם להקדמת הפריחה בשני הגלים. טיפול סידן במים הקדים לפרוח בשני הגלים. בניסוי 7/2006 טיפול חיפוי הקדים פריחה בשני הגלים וכן תרמו לתוספת במשקל הפרח ומספר הפעמוניים. בגל השני טיפול חיפוי גורם לתוספת ביבול הפרחים. בעונה האחרונה (8/2007) במנחרות - חיפוי الكرקע הקדים פריחה, העלה יבול ומספר פעמוניים בשני הגלים. אך בניסוי החממות בעונה זו – לא נמצא תגובה ברורה לטיפול החיפוי (אולי בגל שלא מוקמו כל אחד במבנה שלם – אפקט שלולים). ככל, הטיפול המוביל – חיפוי الكرקע – שיפר במידדי היבול.

באرض האקלים הוא חם ויבש, שכן מגפות של מחלות העובש האפור מתרחשות בחממות משך החורף. הפטרייה: *cinerea* שורדת את הקיץ על שאריות הצמחים ובעיקר על גבעולים עד לתחילת הגידול החדש בסתיו-חורף. וכמו

צמחייה מספקת לתפтир הפטיריה הגנה מפני תנאי סביבה קיצוניים ומפני מיקרואורגניזמים אחרים. בארץ נמצא שתפיטר חבוי בركמה צמחית יבשה אחראי להדבקות הראשונית לאחר הקיץ (Yunis and Elad, 1989). שינוים הם גופי קיימת של פטריות הבוטרייטיס המותאמים להירדות בתנאים קיצוניים. בישראל כמעט ולא נמצא שינוי על צמחים נגועים ב- *B. cinerea*. טמפרטורה גבוהה ותנאי יובש מקזרים מאי את חייו הקשיון בארץ (Yunis and Elad, 1989). בחלוקת ליזיאנטוס נמצא צמחים בודדים עם שינויים על גבי הגבעול. כמו כן לא נמצא שינוי על גבי הגבעולים בצמחים ליזיאנטוס אשר הוזבקו בצורה מלאכותית על מנת לקבל כמהות רבה של שינויים בעקבתה.

لتפיטר החבוי בתוך קטעי גבעול יבשים ולשינויים מתבזיד B-16 יש יכולת השרדות גבוהה בשטח. לאחר שלושה חודשים בקרקע נמצא 73% של קטעי גבעול עם פטריה חיונית ו- 64% שינויים חיוניים מתבזיד B-16. הירדות הקשיונות מתבזיד B-301 היתה נמוכה יותר ותכן שהסיבה לכך היא שטח פנים גדול יותר של הקשיונות מתבזיד B-301. הקשיונות מתבזיד B-301 הם קטנים יותר מקשיונות מתבזיד B-16 ולכך חשופים יותר לפעולות מיקרוביאלית והכימית הקיימות בקרקע.

הוולה חשש שהתפרצויות של מגפות העובש האפור נובעת מnocחות פטריות הבוטרייטיס בחומר הריבוי. לאחר ביצוע מספר בדיקות לא נמצא פטריות הבוטרייטיס בשתייל הלייזיאנטוס.

סיכום: העלים התחתונים (הסמכים לקרקע) בצמחים הלייזיאנטוס רגושים יותר מהעלים העליונים. רגישותם של העלים התחתונים ואופי הצימוח הצפוף של צמחים הלייזיאנטוס, הגורם להופעת תנאי מיקרואקלים מיטביים להתקפות המחללה, גורמים להדבקה והתקדמות מהירה לאורך העלה. הפטיריה עוברת מהעלה הנגוע לגבעול וגורמת לנגיעהו. בתנאים אופטימליים לחות יחסית מעל 95% וטוווח טמפרטורות 22-18 מ'ץ מותקימת הנגיעה חמורה בגבעול וזה יכול לגרום לתמותת הצמח כולו. שימוש ביריעת הפליאטילן כחיץ בין העלה התחתון לקרקע רטובה הפחתת את הנגיעה. בבדיקה רגישותם של שני זני ליזיאנטוס נמצא כי רגישותם תלויות בסוג האיבר המודבק (עליה או גבעול). כמו כן, השפעת עצמת האור על התקפות המחללה תלויות בהירב המודבק. לפטריות הבוטרייטיס יש יכולת השרדות גבוהה בקרקע. לאחר שלושה חודשים הייתה הפטריה בקרקע (בצורת הקשיונות או כתפיטר חבוי בתוך רקמה צמחית יבשה) נמצא 73% של פטריה חיונית בתוך רקמה צמחית יבשה ו- 64% שינויים חיוניים מתבזיד B-16. חיטוי קרקע בתכשירים כימיים כמו אדיגן, קוונדור, טלודריף ומטייל ברומיד היו יעילים בהפחיתה של הפטיריה בקרקע. חיטוי סולרי בלבד הפחתת את חיוניות הפטיריה בדומה לתוכشيرים כימיים. תכשיירי הדבירה נמצא יעילים בהפחיתה של המחללה, אך לא היה יעיל כלל כאשר רוססו לפני ואחרי ההדבקה בבוטרייטיס. ריסוס הסידן על פני העלים לפני ההדבקה נמצא יעיל בהפחיתה של המחללה, אך לא היה יעיל כל תכשירים כימיים בהגמעה הפחתת את התקפות המחללה בצמחים הלייזיאנטוס בתנאים מבוקרים. הוספת סידן ודשן למערכת ההשקייה לא הפחתה כלל את המחללה בהשוואה לטיפולים הכימיים. לשימוש באמצאי הדבירה חלופיים יש פוטנציאל בהדברת מחלות העובש האפור. טיפול טמון וחיפוי קרקע הפחתו את הנגיעה בבוטרייטיס בחממות בטיפולים נפרדים וכטיפול משולב. שינויים בציפוי השטילה יכולים להשפיע על תנאי המיקרואקללים (טמפרטורה ולחות יחסית) בתוך נוף הגידול. בעומד השטילה המדויל רמת המחללה הייתה נמוכה יותר מעומד השטילה הצפוף. אוורור תרס אף הוא להפחיתה המחללה.

רשימת ספרות מצוטטת

- אלעד י, יוניס והקרינר ב (1991) תוספת דשן סידני להפחיתה עובש אפור בחציל, בפלפל ובמלפפון. השדה ע"א 708-706.
- שטיינברג ד, אלעד י, צורו ל, טרגמן מ, מתון א ומסיקה י (2004) פותוח משק להדברת מושלבת של מחלות נוף בחממות אורגניות. סיכום העונה 2002/2003 – מ"פ' דרום, עמ' 35 וקובץ בדיסק דיווחים 9 עמי.
- Baas, R., Marissen, N. and Dik, A.J. (2000) Cut rose quality as affected by calcium supply and translocation. Acta Horticulturae No. 518: 45-54.
- Bar-Tal, A., Baas, R., Ganmore-Neumann, R., Dik, A., Marissen, N., Silber, A., Davidov, S., Hazan, A., Kirshner, B. and Elad, Y. (2001) Rose flower production and quality as affected by Ca concentration in the petal. Agronomie 21: 393-402.

- Dik, A.J. and Wubben J.P. (2004) Epidemiology of *Botrytis cinerea* diseases in greenhouses. In: *Botrytis: Biology, Pathology and Control*, Elad, Y., Williamson, B., Tudzynski, P. and Delen, N. (eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. Pp. 319-333.
- Eden, M.A., Hill, R.A., Beresford, R. and Stewart, A. (1996) The influence of inoculum concentration, relative humidity, and temperature on infection of greenhouse tomatoes by *Botrytis cinerea*. *Plant Pathology* 45: 795-806.
- Elad, Y. (1998) Integrated control of foliar diseases of greenhouse vegetable crops. Proceedings of the International Symposium on Production and Protection of Horticultural Crops, Agadir. (A. Hanafi, M. and Baudoin, eds.), pp. 109-115.
- Elad, Y. (2000). Changes in disease epidemics on greenhouse grown crops. Proceedings of the International Conference and the British-Israeli Workshop on Greenhouse Techniques Towards the 3rd Millennium. (M. Teitel and B.J. Bailey, eds), *Acta Horticulturae* No. 534:213-220.
- Elad, Y. and Kirshner, B. (1992) Calcium reduces *Botrytis cinerea* damages to plants of *Ruscus hypoglossum*. *Phytoparasitica* 20:285-291.
- Elad, Y. and Shtienberg, D. (1995) *Botrytis cinerea* in greenhouse vegetables; chemical, cultural, physiological and biological controls and their integration. *Integrated Pest Management Reviews* 1: 15-29.
- Elad, Y. and Volpin, H. (1993) Reduced sensitivity to grey mould (*Botrytis cinerea*) of bean and tomato plants by means of calcium nutrition. *Journal of Phytopathology* 139:146-156.
- Elad, Y., and Yunis, H. 1993. Effect of microclimate and nutrients on development of cucumber gray mold (*Botrytis cinerea*). *Phytoparasitica* 21:257-268
- Elad, Y., Yunis, H. and Volpin, H. (1993) Effect of nutrition on susceptibility of cucumber, eggplant and pepper crops to *Botrytis cinerea*. *Canadian Journal of Botany* 71:602-608.
- Elad, Y., Williamson, B., Tudzynski, P. and Delen, N. (2004a) *Botrytis* spp. and diseases they cause in agricultural systems – an introduction. In: *Botrytis: Biology, Pathology and Control*, Elad, Y., Williamson, B., Tudzynski, P. and Delen, N. (eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. Pp. 1-8.
- Elad, Y., Williamson, B., Tudzynski, P and Delen, N. (2004b) *Botrytis: Biology, Pathology and Control*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 426 pp.
- Hobbs, E. L., and Waters, W. E. 1964. Influence of nitrogen and potassium on susceptibility of *Chrysanthemum morifolium* to *Botrytis cinerea*. *Phytopathology* 54:674-676.
- Jarvis, W.R. (1992) Managing Diseases in Greenhouse Crops. The American Phytopathological Society Press, St. Paul, Minnesota, USA.
- Legard, D. E., Xiao, C. L., Mertely, J. C., and Chandler, C.K. 2000. Effects of plant spacing and cultivar on incidence of *Botrytis* fruit rot in annual strawberry. *Plant Dis.* 84:531-538.
- Morgan, W. M. 1984. The effect of night temperature and glasshouse ventilation on the incidence of *Botrytis cinerea* in a late-planted tomato crop. *Crop Prot.* 3:243-251.
- Nair, N.G. and Nadtochi, A. (1987) Sclerotia of *Botrytis* as a source of primary inoculum for bunch rot of grapes in New South Wales, Australia. *Journal of Phytopathology* 119: 42-51.
- O'Neill, T. M., Shtienberg, D. and Elad, Y. (1997) Effect of some host and microclimate factors on infection of tomato stems by *Botrytis cinerea*. *Plant Disease* 81: 36-40.
- Sharabani, G., Shtienberg, D., Elad, Y. and Dinoor, A. (1999) Epidemiology of *Botrytis cinerea* in sweet basil and implications for disease management. *Plant Disease* 83: 554-560.
- Shtienberg, D., Elad, Y., Niv, A., Nitzani, Y. and Kirshner, B. (1998) Significance of leaf infection by *Botrytis cinerea* in stem rotting of tomatoes grown in non-heated greenhouses. *European Journal of Plant Pathology* 104: 753-763.
- Stall, R.E., Hortenstine, C.C. and Iley, J.R. (1965) Incidence of botrytis gray mold of tomato in relation to a calcium-phosphorus balance. *Phytopathology* 55: 447-449.
- Starkey, K.R. and Pedersen, A.R. (1997) Increased levels of calcium in the nutrient solution improves the postharvest life of potted roses. *Journal of the American Society of Horticultural Science* 122: 863-868.
- Trolinger, J. C., and Strider, D. L. 1984. Botrytis blight of *Exacum affine* and its control. *Phytopathology* 74:1181-1188.
- Van den Berg, L., and Lentz, C. P. 1968. The effect of relative humidity and temperature on survival and growth of *Botrytis cinerea* and *Sclerotinia sclerotiorum*. *Can. J. Bot.* 46:1477-1481.
- Volpin, H. and Elad, Y. (1991) Influence of calcium nutrition on susceptibility of rose flowers to gray mold. *Phytopathology* 81: 1390-1394.
- Wilson, A.R. (1963) Grey mould of tomato. Etiology of stem infection by *Botrytis cinerea*. Report of the Scottish Horticultural Research Institute for 1962-1963, pp. 79-81.
- Wolcan, S., Ronco, L., Bo, E.D., Lori, G. and Alippi, H (1996) First report of diseases on lisianthus in Argentina. *Plant Disease* 80: 223.
- Yermiyahu, U., Shamai, I., Peleg, R., Dudai, N., and Shtienberg, D. 2006. Reduction of *Botrytis cinerea* sporulation in sweet basil by altering the concentrations of nitrogen and calcium in the irrigation solution. *Plant Pathol.* 55: 544-552.
- Yunis, H. and Elad, Y. (1989) Survival of *Botrytis cinerea* in plant debris during summer in Israel. *Phytoparasitica* 17: 13-21.

סיכום נם שאלות מנהזה

<p>מטרות הממחקר לתקופת הדז'ח תוך התייחסות לתובניות העבודה.</p> <p>הצגת הבעיה: עובש אפור תוקף חמורות לייאנוטוס בסיס הגבעול בצמח שלם ובפצע הגבעול שנוצר כתוצאה מהקטיף וגורם לתמותת צמחים שלמים או גדים. המטרה היא לאפיין את התופעה, ללמידה אמצעים לבקרה של המחלה ולהציג הדברה משולבת שלה.</p> <p>עיקרי הניטויים והפתרונות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדז'ח.</p> <p>מהלך ושיטות העבודה: בנייטויים במעבדה נלמדו התנאים להדבקת בוטריטיס בגבעול לייאנוטוס. נערכו ניסויים בתנאים מסחריים בחומר הבשור בהם יושמו טיפולים אגרוטכניים וטכשיiri הדבירה לבקרה המחלה.</p> <p>פתרונות עיקריות: תנאי לחות וטמפרטורה מיטביים להתקפות המחלה 18-22 מ"ץ אם כי גם בלחות נמוכה עד 65% נתקבלה הדבקה. מעבר בוטריטיס מהעליה לגבעול עובש מאוד או לא התקפת כל בטמפרטורה גבוהה. נמצאה רגישות גבעול שונה בגבאים שונים. בשדה הופחתה המחלה על ידי בוטריטיצדים, ריעיה פרוסה על הקrukע, טפטוף טמון, אוירור בתוך החלקה ודילול השטילה. יבול הפרחים הושפע מייעילות טיפול החדבירה ולעתים הושפע ישירות ללא קשר להפחתת בוטריטיס. סיידן וטכשיiri הפיכתו את המחלה גם במעבדה אך שימוש בדיזון סיידי לא הביא תוצאות משמעותיות כמו הטיפולים האחרים. מדבק של בוטריטיס שרד תקופה ארוכה בקץ וחיטויי קrukע הפיכתו את חיותו. שילוב טיפולים הביא להפחתה רבה ביותר במחלה ולהפחתה דרסטית לצורך לרסת תכשיiriים כימיים.</p> <p>המסקנות המדיעות וההשלכות לגבי יישום הממחקר והמשכו. האם הושגו מטרות הממחקר בתקופה שנדרה לביצוע תוכנית הממחקר.</p> <p>ניתן להפחית מחלה באמצעות קולטוראלים תוך שילוב אמצעי הדברה ויישום מוגבל של תכשיiriים כימיים.</p> <p>הבעיות שנתרנו לפתרון / או השינויים שהלו במהלך העבודה (טכנולוגים, שיווקיים ואחרים): התייחסות המשך הממחקר לנגבו, האם יושגו מטרות הממחקר בתקופה שנדרה לביצוע תוכנית הממחקר.</p> <p>המטרות הרשגו</p> <p>האם הוחל כבר בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדז'ח? כן, דוחות, פרסומים והרצאות</p>
<p>אלעד י, רב דוד ד, שפיראלטר ל, דורית ע, בן יונס ל, מתן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי י ומור י (2006) התמודדות מושכלת עם בוטריטיס המגע לייאנוטוס. מ"פ דרום סיכום עונה, תקצירים 2004-05, ע' 16-17 ו디וח מלא באחר המ"פ 4 עמ'.</p> <p>אלעד י, רב דוד ד, שפיראלטר ל, דורית ע, בן יונס ל, מתן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי י, מור י, ירמייהו א (2007) התמודדות מושכלת עם בוטריטיס המגע לייאנוטוס. מ"פ דרום סיכום עונה, תקצירים 2005-06, ע' 31 ודיוח דיגיטלי מלא 21 עמ'.</p> <p>אלעד י, רב דוד ד, דורית ע, בן יונס ל, מתן א, מסיקה י, ברונר מ, נישרי י ומור י, ירמייהו א ושפיראלטר ל (2008) התמודדות מושכלת עם בוטריטיס המגע לייאנוטוס. חוברת תקצירים בעריכת מתן א (עורך) מ"פ דרום סיכום עונה 07-2006, ע' 1-37 ו 25 עמודים באתר http://www.mopdarom.org.il/frame_master.htm.</p> <p>Shpialter, L., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D., Matan, E., Messika, Y., Bruner, M., Nishri, Y., Mor, I. and Elad, Y. (2007) Integrated management of grey mould (<i>Botrytis cinerea</i>) in <i>Lisianthus</i>. <i>Phytoparasitica</i> 35:202.</p> <p>Elad, Y., Shpialter, L., Korolev, N., Mamiev M., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D. Matan, E. Messika Y. (2007) Chemical and cultural means of control integrated for grey mould (<i>Botrytis cinerea</i>) management in lisianthus. 15th International Reinhardtsbrun Symposium on Modern Fungicides and Antifungal Compounds, Friedrichroda, Germany, 6-10.5.2007.</p> <p>Shpialter, L., Elad, Y. Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D., Matan, E. and Messika, Y. (2007) Integrating cultural means of control for grey mould (<i>Botrytis cinerea</i>) management in lisianthus. XIVth International <i>Botrytis</i> Symposium, 21-26.10.07 Cape Town, South Africa, p. 73.</p> <p>Elad, Y., Shpialter, L., Korolev, N., Mamiev M., Rav David, D., Dori, I., Ganot, L., Shmuel, D. Matan, E. Messika Y. (2008) Chemical and cultural means of control integrated for grey mould (<i>Botrytis cinerea</i>) management in lisianthus. In: Modern Fungicides and Antifungal Compounds. (P.E. Russell, H.-W. Dehne, eds), Intercept, Aandover, Hants, UK, pp. in press.</p>
<p>פרסום הדז'ח: אני ממילץ לפרסם את הדז'ח: (סמן אחת מהאפשרויות)</p> <p>לא הנבליה (בספריות ובאינטראקטיב)</p>

נספח 1: תאוור ותוצאות המעבדה בגרפים וטבלאות

צירור 1.1 : הדבקת פצני גבעול בקטני
גביעול וצמחיים שלמים

Effect of *Botrytis cinerea* inoculum type and inoculation method on severity of gray mold expressed as length of rot development along the stem (A, C) and intensity of conidiation expressed as percent of rot area covered by conidiophores and conidia (B, D) in lisianthus pieces from Nodes 2 and 3 (A, B) and on stem cuts in whole plants (C, D). We inoculated the excised stems by placing mycelial plugs on their wounds or by inoculating the plant tissue with drops of an aqueous conidial suspension, or with dry conidia present in the air or dusted onto the wound. Bars represent the SE of each mean.





Table: Effects of type of *Botrytis cinerea* inoculum on severity of gray mold infection and intensity of conidiation in lisianthus stem pieces from Nodes 2 and 3 and on stem wounds of whole plants^x. Results are presented as areas under disease progress curves (AUDPC, cm × days) and conidiation (AUDPC, %×days) through 6 days after infection. Data are shown in Fig.


Inoculation	Stem pieces		Whole plant stem wounds	
	Infection severity <i>P</i> =0.054	Conidiation <i>P</i> <0.001	Infection severity <i>P</i> <0.001	Conidiation <i>P</i> <0.001
Mycelium	9.6 a ^y	118.5 a	5.4 b	15.0 b
Suspension	11.3 a	36.5 b	8.1 a	67.0 a
Brush dusting	N.T. ^z		2.3 c	0 c
Dry inoculation	N.T.		7.2 ab	24.0 b

^x20 ± 1°C, 1020 lux and 97 ± 3% RH. ^yTreatments in each column followed by a common letter are not significantly different from each other according to Fisher's protected LSD test. ^zN.T. = not tested.

	פרק (מס')	חומרת ריקבון (סמי')	<i>P</i> <0.0001
ג	0.5	0	
א	1.25	1	
א	1.25	2	
א	1.5	3	
ב	0.875	4	
ג	0	5	



Effect of node height on the on the severity of gray mold expressed as length of rotten area along the stem following inoculation with *Botrytis cinerea* mycelial plugs after wounding. Bars represent the SE of each mean.



Effect of node position and cut direction on severity of gray mold expressed as length of rotten area along the stem (A, C) and intensity of conidiation expressed as percent of rot area covered by conidiophores and conidia (B, D) in lisianthus nodes. Stem pieces were excised horizontally from Nodes 1-6 (A, B) or excised from Nodes 2-4 and cut horizontally or diagonally (C, D) and were subjected to conidia inoculation. Bars represent the SE of each mean.

ציור 1.3 חומרת הנגיעה ועוצמת ההנבגה בקטעי גבעול ובגדמים על צמח שלם.
 א' בקטעי גבעול מנוקקים הבדיקה בוצעה בפרקי 2-4 של צמחי ליזיאנטוס בתרחיף נגיס של בוטרייטיס לאחר חיתוך או פקיק של הפרק או חיתוך אלכסוני. ב' בגדמים על צמח שלם הודבקו פרקי 5-0 בעקבות חיתוך אופקי בלבד.

Effect of node position on severity of gray mold in lisianthus stems pieces with horizontal wounds^y. Results are presented as areas under disease progress curves (AUDPC; cm × days) and conidiation (AUDPC; % × days) through 7 days after infection (Fig. A, B).

Node no.	Rot		Conidiation	
	AUDPC	P<0.001	AUDPC	P<0.0001
0	2.9	d ^z	82	c
1	5.0	c	98	bc
2	17.5	b	131	b
3	21.9	a	205	a
4	16.4	b	170	a
5	0	e	0	d

^x20 ± 1°C, 5150 lux and 97 ± 3% RH. ^zTreatments in each column followed by a common letter are not significantly different from each other according to Fisher's protected LSD test.


Effects of node position and type of wound on severity of gray mold in excised lisianthus stems^y. Results (means ± SE) are presented as areas under disease progress curves (AUDPC; cm × days) through 7 days after infection (Fig. 3C, D).

Node no. and cut direction	Rot		Conidiation		
	AUDPC	P<0.0011	AUDPC	P<0.001	
Horizontal	2	15.5±0.5	a ^z	211±6.0	b
	3	15.9±0.0	a	320±0.0	a
	4	15.0±0.0	a	315±5.2	a
Diagonal	2	8.2±0.6	b	70±11.4	d
	3	16.5±0.3	a	120±14.7	c
	4	16.8±3.4	a	121±33.4	c

P values for significance of major treatment factors and their combinations

Rot	Conidiation		
	Type of cut	Node no.	Cut × Node no.
Type of cut	Node no.	Cut × Node no.	
P=0.0574	P=0.0041	P=0.0053	
Horizontal	a	2	b n.s.
Diagonal	a	3	a
		4	a
	Type of cut	Node no.	Cut × Node no.
	P<0.0001	P<0.0001	P=0.0859
	Horizontal	a	2
	Diagonal	b	3
			4
			a

^y20 ± 1°C, 1020 lux and 97 ± 3% RH. ^zTreatments in each column followed by a common letter are not significantly different from each other according to Fisher's protected LSD test. n.s. = not significant.



Effects of temperature and RH on the rate of development of *Botrytis cinerea*-incited rot along lower (A, C) and upper (B, D) leaves expressed as the lesions' distance from the stem. Bars represent the SE of each mean.

צירור 1.4 התקדמות נגימות בברוטריטיס בעליים של ליזיאנthus לכיוון הגבעול, הודבקו עליהם עליונים ותחתונים בצמח. מודגמת התקדמות ב-18 ו-26 מ"ץ בלבד.
טבלה: השפעת טמפרטורה ולחות על התקדמות הריקבון לאורך העלה עבור הגבעול.

TABLE Effects of temperature and RH on the rate of development of *Botrytis cinerea*-incited rot along attached *Lysianthus* leaves^y. Results (means \pm SE) are presented as growth rates (mm/day). Data are shown in the Fig.


Temperature (°C)	Leaf position (node)	RH (%)			
		91-94	95-96	97-99	>99
18	1	2.20 \pm 0.32	3.27 \pm 0.46	2.94 \pm 0.49	3.10 \pm 0.95
	6	1.17 \pm 0.39	2.60 \pm 0.59	1.29 \pm 0.95	3.20 \pm 0.69
20	1	3.67 \pm 0.21	2.20 \pm 0.58	2.67 \pm 0.60	3.92 \pm 1.10
	6	2.98 \pm 0.25	2.56 \pm 0.85	2.75 \pm 0.85	2.58 \pm 0.56
26	1	1.19 \pm 0.35	0.96 \pm 0.08	0.27 \pm 0.11	2.94 \pm 0.52
	6	0.73 \pm 0.52	0.54 \pm 0.64	0.31 \pm 0.11	1.46 \pm 0.31

P values for significance of major treatment factors and their combinations

Temperature (°C)	RH (%)	Leaf position (node)	Interactions	P
P<0.0001	P=0.0080	P=0.0014		
18 a	91-94 b	1 a	Temp. \times RH	0.0279
20 a	95-96 ab	6 b	RH \times Position	0.3842
26 b	97-99 ab		Temp. \times Position	0.4038
	>99 a		Temp. \times RH \times Position	0.7173

^y Light intensity 5150 lux.

^zTreatments of each parameter in each row followed by a common lower case letter and numbers in each column followed by a common capital letter are not significantly different from each other according to Fisher's protected LSD test.



Effects of temperature and RH on the severity of *Botrytis cinerea* infection of excised lisanthus stem pieces. Severity is expressed as the length of lesions along the stem. Bars represent the SE of each mean.

চিত্র 1.5 השפעת טמפרטורה ולחות יחסית על חומרת מחלת בקטעי גבעול

טבלה: השפעת טמפרטורה ולחות יחסית על מחלת בקטעי גבעול, טבלת סיכום ערכי שטח מתחת לעקומה

Effects of temperature and RH on the severity of *Botrytis cinerea* infection and conidiation on excised lisanthus stem pieces^y. Results (means \pm SE) are presented as areas under disease progress curves (AUDPC; cm \times days for infection and % \times days) through 8 days after infection (results of two RH levels are presented in the Fig.).

Rot development

Temperature (°C)	RH (%)											
	65	75	85	94	97	99						
12	9.4 ^{c^z}	C	9.2 ^d	C	11.5 ^d	A	9.9 ^b	BC	11.1 ^b	AB	10.5 ^c	ABC
15	13.3 ^{ab}	D	14.8 ^c	C	14.6 ^c	CD	16.7 ^a	A	15.3 ^a	BC	16.4 ^b	b AB
18	14.6 ^{ab}	C	17.8 ^b	A	17.3 ^b	AB	16.6 ^a	AB	18.4 ^a	A	17.7 ^b	b A
22	16.0 ^a	C	20.8 ^{ab}	A	18.1 ^b	B	18.2 ^a	B	17.9 ^a	BC	18.0 ^{ab}	BC
25	17.8 ^a	A	21.2 ^a	A	21.2 ^a	A	18.2 ^a	A	17.1 ^a	A	19.8 ^a	A
29	11.3 ^{bc}	A	11.2 ^d	A	4.7 ^e	B	1.8 ^b	B	2.7 ^c	B	2.6 ^d	B


Conidiation

Temperature (°C)	RH (%)											
	65	75	85	94	97	99						
12	0 b ^z	B	3.0 c	B	24.0 bc	A	30.0 c	A	23.7 b	A	18.0 b	A
15	15.0 a	B	24.3 bc	B	50.4 b	B	123.0 b	A	99.6 a	A	120.0 a	A
18	16.5 a	B	35.1 ab	B	130.6 a	A	172.0 a	A	113.5 a	A	152.5 a	A
22	12.9 a	B	60.3 a	B	146.5 a	A	172.0 ab	A	157.0 a	A	0.9 b	B
25	15.0 a	B	45.9 ab	A	46.0 b	A	36.9 c	AB	29.7 b	AB	9.0 b	B
29	0 b	-	0 c	-	0 c	-	0 c	-	23.7 b	-	0.9 b	-

^y Light intensity 5150 lux.

^zFor each parameter, treatments in each RH column followed by a common lower case letter and in each temperature row followed by a common upper case letter, are not significantly different from each other, according to Fisher's protected LSD test. Since the interaction of temperature \times RH was found to significantly affect both rot development and conidiation ($P < 0.0001$), the general effects of each parameter were not tested.

Effects of temperature and RH on the severity of *Botrytis cinerea* infection of stem wounds of lisanthus plants. Severity is expressed as length of rot development along the stem. Bars represent the SE of each mean.



циור 1.6 השפעת טמפרטורה ולחות על הדבקת גדמי גבעול מותוארת בציורים (למעלה)

טבלה : קצב התפתחות-מחלה וערכי שטח מתחת לעקומה

Table: Effects of temperature and RH on the severity of *Botrytis cinerea* infection and conidiation on lisanthus stem wounds on whole plants^y. Results (means \pm SE) are presented as areas under disease progress curves (AUDPC; cm \times days and % \times days, respectively) and as rate of development through 7 days after infection and rate (cm/day) of disease development (Disease severity is described in Fig.).


Temperature (°C)	Rot severity			Conidiation		
	RH (%)			RH (%)		
	70-85	85-95	>99	70-85	85-95	>99
Severity AUDPC						
18	1.50 \pm 0.6	4.50 \pm 1.9	10.1 \pm 1.2	0.0	0.0	23.5 \pm 5.4
22	4.37 \pm 1.5	6.12 \pm 1.5	8.0 \pm 1.9	0.0	0.0	20.7 \pm 4.1
26	0.75 \pm 0.2	1.75 \pm 0.3	7.2 \pm 1.7	0.0	0.0	7.7 \pm 5.4
Rate of development						
18	0.25 \pm 0.09	0.31 \pm 0.12		0.0	0.0	3.7 \pm 0.9
22	0.23 \pm 0.18	0.37 \pm 0.16	0.46 \pm 0.0001	0.0	0.0	2.5 \pm 0.01
26	0.04 \pm 0.03	0.06 \pm 0.02	0.28 \pm 0.12	0.0	0.0	1.3 \pm 0.9

P values for significance of major treatment factors and their combinations

Temperature (°C)	RH (%)	Temperature \times RH	Temperature RH (%) (°C)	Temperature \times RH
Severity AUDPC				
P=0.0156	P=0.0001	P=0.2573	n.s.	
18 ab ^z	70-85 b			
22 a	85-95 b			
26 b	>99 a			
Severity rate				
P=0.0251	P=0.0598, n.s.	P=0.6062	n.s.	
18 ab	70-85 a			
22 a	85-95 a			
26 b	>99 a			
Conidiation AUDPC				
P=0.348	n.s.	P=0.0001	P=0.3781	n.s.
3				
18 a	70-85 b			
22 a	85-95 b			
26 a	>99 a			
Conidiation rate				
P=0.04		P<0.0001	P=0.2631	n.s.
58				
18 a	70-85 b			
22 a	85-95 b			
26 b	>99 a			

^y Light intensity 5150 lux.

^zTreatments in each column of either AUDPC or rate value followed by a common letter are not significantly different from each other, according to Fisher's protected LSD test.



Effect of light intensity on the severity of *Botrytis cinerea* infection of leaves of lisianthus cultivars Yellow Catalina (A) and Echo Champagne (B). The severity of gray mold infection is expressed as percentage of maximal rot area. Bars represent the SE of each mean.

ציר 1.7 חומרת מחלת בקטעי גבעול ועלים בשלוש עצמות תאורה ושני זנים בעוצמת תאורה גבוהה. פרוט התוצאות מופיע בטבלה שמתוחת לציר.

Effects of light intensity on the severity of *Botrytis cinerea*-incited infection on excised stem pieces and leaves of two lisianthus cultivars^y. Results (means \pm SE) are presented as areas under disease progress curves (AUDPC; cm \times days) through 8 days after infection. Data are shown in the Fig.


Cultivar	Rot			Conidiation		
	Light intensity (lux)			Light intensity (lux)		
<u>Excised stem pieces</u>						
Yellow Catalina	138.8 \pm 4.1	158.4 \pm 5.2	173.4 \pm 3.8	98.2 \pm 9.5	130.5 \pm 13.7	187.0 \pm 24.3
Echo Champagne	119.8 \pm 3.7	130.4 \pm 6.2	140.4 \pm 3.1	82.2 \pm 9.4	66.2 \pm 11.6	104.5 \pm 18.8
<u>Excised leaves</u>						
Yellow Catalina	427.5 \pm 96.7	91.6 \pm 37.3	80.4 \pm 24.9			
Echo Champagne	522.5 \pm 45.7	325.4 \pm 81.4	201.2 \pm 54.1			

P values for significance of major treatment factors and their combinations

Rot			Conidiation		
Cultivar	Light intensity	Cultivar \times light intensity	Cultivar	Light intensity	Cultivar \times light intensity
<u>Excised stem pieces</u>					
P<0.0001	P<0.0001	P=0.3106	P<0.0001	P=0.0007	P=0.0763
Yellow Catalina a	140 c	n.s.	Yellow Catalina a	140 b	n.s.
Echo Champagne b	1020 b		Echo Champagne b	1020 b	
	4860 a			4860 a	
<u>Excised leaves</u>					
P=0.0023	P<0.0001	P=0.4146			
Yellow Catalina b	140 a	n.s.			
Echo Champagne a	1020 b				
	4860 b				

^y20 \pm 1°C, 5150 lux and 97 \pm 3% RH.


^zTreatments of each parameter in each row followed by a common lower case letter and numbers in each column followed by a common capital letter are not significantly different from each other according to Fisher's protected LSD test.
n.s. = not significant.



צירור 1.8: מבחן קטעי גבעול ועלים לבדיקת פוטנציאל הדברת בוטרייטיס על ידי תכשירי הדבקה וטידין

טבלה 1.8: חומרת מחלה והנגנה מבוטאת כשתה מתחת לעקומה, לפי מועד היישום יחסית לדבקה ואثر היישום

	לפני הדבקה-גבועל								אחרי הדבקה-גבועל								עליה	
	ריקבון הנגנה				ריכוז (%) הנגנה				ריקבון הנגנה				ריכוז (%) הנגנה					
היקש	Teldor	Rovral	Mythos	Polar	Switch	Silvacur	CaNO ₃	היקש	Teldor	Rovral	Mythos	Polar	Switch	Silvacur	CaNO ₃		עליה	
24.9	0	56.5	94.8	59.8	41.4	84.6	0.15	24.9	0	2.2	19.6	0	9.6	30.3	0.15	0	טלדור	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	רוברל	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.25	0	מייטוס
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	פולאר
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.1	סוויז	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.2	0.15	0.15	סילבקרור	
47.0	33.3	83.2	19.0	47.0	47.0	81.8	0.1	47.0	33.3	83.2	19.0	47.0	81.8	0.1	0.1	0.1	ניטראט הסידן	




ציר 1.9: הדברת בוטריטיס בליזיאנטוס באמצעות הגמעה בתכשיiri הדבירה וקלנית. מחלה בצמחים שלמים (למעלה) ובקטעי גבעול (למטה). חומרת המחלה מבוטאת כארוך קטע הגבעול שנרכב (משמאל) ומידת ההנגעה (מיימן).

טבלה: חומרת מחלה והנגעה מבוטאת בערכי שטח מותחת לעקומה (צירור 1.9).

טיפול	גדמים על הצמח						רכזו (%)
	רכבו	הנגעה	רכבו	הנגעה	רכבו	הנגעה	
מים	59.0	א	116.5	ב	41.9	א	83.9
DSH (היקש)	77.0	א	153.5	א	41.3	א	76.6
DSH + SiO ₂	40.2	ב	107.9	ב	17.3	ב	60.6
טדרור	17.3	בג	54.7	ב	14.1	ג	31.7
טדרור.	0	ג	43.2	בג	12.9	בג	55.0
מייטוס	0	ג	1.8	ג	0	ג	0.005
מייטוס	0	ג	0	ג	0	ג	0.01


<i>P<0.0001</i>	AUDPC	טיפול
	147.6	לא חיפוי
	78.8	חיפוי פוליאתילן



চিত্র 1.10 הבדיקה עלים סמוכים לקרקע בבוטריטיס בצמחים שלמים עם ולא ירידת פוליאתילן הפרוסה על פני הקרקע

Effect of a polyethylene barrier placed between the lower leaves and the surface of the growth medium on lower leaf infection by *Botrytis cinerea*. The severity of gray mold infection is expressed as percentage of maximal rot area. Bars represent the SE of each mean.

נספח 2 : הדבורה משלובת (חיפוי קרקע וטפטוף טמן) של בוטריטיס בליזיאנטוס במנחרות עבירות בחווות הבשור 2004-2005



The effects of deep drip irrigation and polyethylene ground cover on the incidence of gray mold of lisanthus stems (Commercial Greenhouse Experiment 1, walk in tunnels 2004-2005) expressed as number of dead plants. Different letters represent significant differences, according to Fisher's protected LSD test ($P \leq 0.05$).

צייר 2.1 : השפעת חיפוי קרקע וטפטוף טמן על בוטריטיס בליזיאנטוס במנחרות עבירות בחווות הבשור בעונת 2004-2005. בטבלה שלמטה מופיעים גם נתוני היבול.

Table: The effects of deep drip irrigation and polyethylene ground cover on gray mold of lisanthus stems and flower yield (Commercial Greenhouse Experiment 1, walk-in tunnels 2004-2005). Results are presented as means \pm SE. Dead plant results are presented as areas under disease progress curves (AUDPC) for Days 70 through 190 after planting (number \times days; Fig.).

Soil mulch	Drip irrigation	Incidence of dead plants		Yield (flowers/m ²)		
		(AUDPC, no. \times days)	1st flowering stage	2nd flowering stage	1st flowering stage	
Bare soil	Surface dripper	2432.0	a ²	69.1 \pm 2.0	a	107.2 \pm 16.1 b
Soil mulch	Surface dripper	374.8	b	65.3 \pm 3.5	a	85.7 \pm 5.2 c
Bare soil	Deep drippers	321.5	b	65.9 \pm 2.9	a	99.3 \pm 12.1 bc
Soil mulch	Deep drippers	331.0	b	70.2 \pm 1.5	a	133.2 \pm 7.2 a

²Treatments in each column followed by a common letter are not significantly different from each other, according to Fisher's protected LSD test. The soil mulch \times drip irrigation interaction was found to significantly affect ($P = 0.0042-0.0093$), so the effects of the major treatment factors are not presented.

טבלה 2.2 : השפעת הטיפולים על שעור הפרחים (%) במהלך הגדל הראשון טפטוף טמן וחיפוי ניסוי 2005-2004

20/4/05	18/4/05	12/4/05	3/4/05	23/3/05	10/3/05	3/3/05	24/2/05	
100.0	81.6	76.7	67.1	62.1	51.9	43.4	35.3	לא חיפוי טפטוף טמן
100.0	81.6	76.0	69.4	66.3	56.3	51.0	41.2	לא חיפוי טפטוף עלי
100.0	82.0	79.5	74.6	70.7	60.8	52.5	44.4	חיפוי טפטוף טמן
100.0	85.0	78.8	70.5	64.5	54.5	46.6	34.8	חיפוי טפטוף עלי

טבלה 2.3 : שעור הפרחים בקטיפ הראשוון של הגדל השני (%) : הפרחים נקטפו בין 9.6-27.6 במהלך חמשה קטיפים


9/6/05		
19.6	לא חיפוי	טפטוף טמן
27.2	לא חיפוי	טפטוף עלי
42.7	חיפוי	טפטוף טמן
27.8	חיפוי	טפטוף עלי



תמונה 2: מנהרה ללא חיפוי קרקע



תמונה 1: מנהרה עם חיפוי קרקע



Temperature, RH and dew presence during two days in January 2005 measured in walk in tunnels of Commercial Greenhouse Experiment 2005 2004.

চিত্র ২.২ : তন্মুক্ত মালভাবে দৈনন্দিন পরিস্থিতি (লম্বা) এবং উর্বর মাত্রায় (g) মধ্যে মাধ্যমিক মারোকালি ও মাত্রায় মারোকালির মধ্যে পরিপর্যবেক্ষণ (তালিকা)


তোষী ছাতো ধৰণ (মাত্রা %)												মাত্রায় তম্পৰেটোরুৱ (মাত্রা °C)				মাত্রায় মারোকালি
৭০-১০০	৮০-৯০	৭০-৮০	৬০-৭০	৫০-৬০	৪০-৫০	৩০-৪০	৩০-৪০	২৫-৩০	২০-২৫	১০-২০	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি		
০.৯৮	০.২৫	০.২৫	০.২৮	০.৯৭	০.৭১	০	০.৯৯	০.৯৯	-০.৯৭	০.২৬	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	
০.৯৯	০.০৫	০.৫৫	০.৭৪	০.৩০	০.১০	০	০.৯৯	০.৯০	-০.৯৮	০.১৭	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	
০.৯৯	০.০২	০.৬৬	০.৪৫	০.৭৭	০.৪০	০.৪৯	০.৯৯	০.৯১	-০.৯৮	০.১৫	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	
০.৯৯	০.০৬	০.৫০	০.৬৭	০.৮৩	০.৬০	০	০.৮৩	০.৫৫	-০.৯৫	০.০৮	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	
০.৯৮	০.৭৩	০.৮৯	০.০৮	০.৮৭	০.৫৬	০.৪৯	০.৯৯	-০.৮৮	-০.৯৯	০.০৬	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	
০.৯৯	০.১৬	০.৭৫	০.৭৬	০.৯১	০.০৭	০.৪৯	০.৯৭	-০.৬৬	-০.৯০	০.১৭	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	শুবু মারোকালি	

উর্বর মারোকালি মাত্রায় মারোকালি মাত্রায় মারোকালি মাত্রায় মারোকালি

נספח 3: הדביה משולבת (חיפוי קרקע ודיישון) של בוטריטיס בליזיאנתרופוס במנחרות עבירות הבשור 2005


צמחים שלמים נגועים בבוטריטיס

- ◊ ללא חיפוי קרקע
- ◻ +ריסוס סידן
- △ +דיישון בסידן
- +דיישון+ריסוס



גדמי גבעול נגועים בבוטריטיס

The effects of polyethylene ground cover, Ca sprays and fertigation treatments on the incidence of gray mold of lisianthus stems (Commercial Greenhouse Experiment 2, walk-in tunnels 2005-2006) expressed as number of dead plants. Bars represent the SE of each mean.



צייר 3.1: חומרת מחלה בצמחים שלמים וגdimים בניסוי מינחרות חותם הבשור 6

The effects of polyethylene ground cover and Ca sprays treatments on gray mold of lisianthus stems and flower yield (Greenhouse Experiment 2, walk-in tunnels 2005-2006). Dead plant results are presented as areas under disease progress curves (AUDPC) for Days 20 through 110 after inoculation (number × days).

Soil mulch	Ca fertigation	Ca spray	Incidence of dead plants, AUDPC (no. × days)		Flower yield, 1st flowering stage (no./m ²)
			Whole plants	Plant stubs	
1 -	-	-	114.6±37.2	a ^z	52.6±2.6 a
2 -	-	+	30.6±15.4	c	54.0±4.6 a
3 -	+	-	65.4±16.0	b	52.4±3.7 a
4 -	+	+	39.7±26.5	bc	56.0±2.0 a
5 +	-	-	0	d	36.6±2.4 b
6 +	-	+	17.1±19.8	cd	42.8±2.0 ab
7 +	+	-	6.6±7.0	d	46.0±1.9 ab
8 +	+	+	19.9±12.9	cd	48.2±2.5 ab

P values for significance of major treatment factors and their combinations

Whole plant stem infection

Soil mulch	Ca fertigation	Ca spray	P
P=0.003	P=0.3063	n.s.	
- a -	-	P=0.2325	n.s. Mulch × Ca fertigation
+ b +	+	+	Mulch × Ca spray
			Ca fertigation × Ca spray
			Mulch × Ca fertigation × Ca spray

Plant stub infection

Soil mulch	Ca fertigation	Ca spray	P
P=0.0001	P=0.9234	n.s.	
- a -	-	P=0.0775	n.s. Mulch × Ca fertigation
+ b +	+	+	Mulch × Ca spray
			Ca fertigation × Ca spray
			Mulch × Ca fertigation × Ca spray


Yield

Soil mulch	Ca fertigation	Ca spray	P
P=0.0021	P=0.1042	n.s.	
- a -	-	P=0.1839	n.s. Mulch × Ca fertigation
+ b +	+	+	Mulch × Ca spray
			Ca fertigation × Ca spray
			Mulch × Ca fertigation × Ca spray

^zTreatments in each column followed by a common letter are not significantly different from each other, according to Fisher's protected LSD test. n.s. = not significant.

טבלה 3.2 : שער הפרחים הפורחים בקטיפי הגל הראשון בניסוי הדבורה משולבת (חיפוי קרקע ודיישון) של בוטריטיס
בליזיאנטוס במנזרות עבירות בחוות הבשור 2005-2006

	12/2/06	11/1/06	3/1/06	20/12/05	טיפול
	100.0	81.6	65.6	33.5	לא חיפוי לא סיון
	100.0	82.9	68.1	40.7	לא חיפוי לא סיון+ריסוס
	100.0	77.7	62.3	30.4	לא חיפוי עם סיון
	100.0	81.5	71.7	43.5	לא חיפוי עם סיון+ריסוס
	100.0	69.1	54.4	36.1	עם חיפוי לא סיון
	100.0	73.3	56.7	42.5	עם חיפוי לא סיון+ריסוס
	100.0	74.1	57.6	46.2	עם חיפוי עם סיון
	100.0	79.3	68.1	51.9	עם חיפוי עם סיון+ריסוס



ציור 3.2 : תנאי מיקרואקלים במשנֶ
יומיים (למעלה)



Temperature, RH and dew presence
during two days in January 2005
measured in the walk in tunnels of
Commercial Greenhouse Experiment
2005 2006.

הרכבי דשנים בניסוי

		סיכום חרכבי דשן
		תנקה (%)
	73.0	72.0
	79.0	80.4
	13.5	13.5
	98.8	103.1
		אשלגן

טיפול	B		A
	ביקורת	תוספת סידן	סידן (ח"מ)
שם חדשן	300	מי ברוז (70 ח"מ) מי ברוז+40	
קליניט	50	170	
אמון חנקתי	30	30	
זרחותית	150	270	
אשלגן חנקתי			
MAP	70		
גופרת אמון			
אוראה	100		
אשלגן כלורי	100		
קורטיזון רגיל			



השפעת תוספת סידן על מספר הפקעים בתפרחת



ציור 3.3 : הדבירה מושלבת (חיפוי קרקע ודיישון) של בוטרייטיס בלייזיאנטוס במינוחות עבירות בחרוות הבשר 2005 – 2006 – תוצאות יבול, גל ראשון לעלה וגל שני למטה.

גל שני


השפעת חיפוי קרקע ותוספת סידן על יבול הפורחים השפעת תוספת סידן על יבול הפורחים



השפעת תוספת סיון על משקל הפרח



השפעת תוספת סידן על אורך הפרח



טבלה 3.4 : שעור הפרסומים הפורחים בקטיפי הגל: השני בניסוי הדברה משולבת (חיפוי קרקע ודישון) של בוטריטיס בז'יאנטוס במנradorות עבריות בחוות הבשור 2005-2006

14/6/06	8/6/06	29/5/06	27/5/06	23/5/06	22/5/06	
100.0	91.4	57.8	33.1	17.6	6.0	לא חיפוי ללא סידן
100.0	89.7	61.8	38.1	20.0	7.4	לא חיפוי עם סידן
100.0	90.4	55.5	29.9	15.3	6.8	עם חיפוי ללא סידן
100.0	90.4	58.5	35.6	19.5	8.2	עם חיפוי עם סידן

טבלה 3.5: **תכולת יסודות בעלה רביעי מהקודקוד במועד דגימה ראשון**

מגניטו	סידן	אלגן	זורתן	חנקן	חיפוי דישון סידן
0.44	0.24	1.46	0.12	2.09	- -
0.42	0.32	1.60	0.15	2.49	- +
0.44	0.24	1.72	0.15	2.56	+ -
0.43	0.32	1.75	0.15	2.64	+ +


טבלה 3.3: תכונות יסודיות בעליים בשני גברים ובגבעול במועד דגימה שני

חיפוי Ca	דישון Ca	ע' תחתון	ע' עליון גבעול	חנקן	חנקן	חנקן	חנקן	חנקן
זרחן								
0.04	0.11	0.09	-	-	0.83	2.24	1.88	-
0.05	0.12	0.09	-	+	0.79	2.57	2.07	-
0.06	0.15	0.12	+	-	0.86	2.74	2.38	+
0.05	0.14	0.10	+	+	0.68	2.57	2.32	+
מנגנוני								
אשלגן								
0.13	0.65	0.71	-	-	2.44	3.93	3.95	-
0.12	0.74	0.82	-	+	3.12	4.89	4.75	-
0.12	0.80	0.88	+	-	2.73	4.56	4.71	+
0.15	0.77	0.85	+	+	2.90	5.12	4.92	+
סידן								
					0.11	0.37	0.52	-
					0.11	0.49	0.63	-
					0.09	0.54	0.60	+
					0.11	0.61	0.66	+


נספח 4: הדבורה משולבת (עומד צמחים ותכשורי הדבורה) של בוטרייטיס בליזיאנטוס, חמורה בחוות הבשור 2005 2006

גלאשון
שתייה דלילה







חומרים



אחווי מחלת בצמח שלם



אחווי מחלת בגדים



שכיחות

Time from infection (days)

ציור 4.1: שכיחות (מספרים מוחלטים ואחוויים) צמחים שלמים וגדים הנגועים בבוטרייטיס הדבורה משולבת (עומד צמחים ותכשורי הדבורה) של בוטרייטיס בליזיאנטוס, חמורה בחוות הבשור 2005 2006.

שעור
המחלה
בפרחים




Table: *B. cinerea* disease incidence in lisianthus planted in two densities in soil in a commercial like greenhouse following the first harvest (Field experiment 2005 2006). Results are presented as area under disease progress curve during 115 days (%*days)

Conc. (%)	Disease incidence, AUDPC (No./m ² *days)				Calculated percent incidence, AUDPC (%*days)			
	Whole plants		Plant stubs		Whole plants		Plant stubs	
	Plant density (no./m ²)				50	70	50	70
Control	185.1 b	937.1 a	1684.4 ab	2435.6 a	285.0 b	1036.2 a	2580.6 a	2679.8 a
Alternation ^a	9.6 b	189.3 b	650.6 c	1095.6 bc	14.1 b	208.5 b	1006.3 b	1267.4 b
Mythos	0.25	16.4 b	56.8 b	579.6 c	885.6 bc	25.4 b	61.3 b	921.6 b
Teldor	0.15	29.3 b	185.0 b	1019.6 bc	1121.4 bc	48.5 b	204.3 b	1279.4 b
	Incidence of flower infection							
Conc. (%)	Number/m ² at 115 days AUDPC (No./m ² *days)							
	50	70	50	70				
Control	2.3 b	12.3 a	27.0 ab	89.5 a				
Alternation ^a	2.2 b	4.5 b	27.4 ab	30.0 ab				
Mythos	0.25	0.2 b	2.3 b	4.1 b	17.9 ab			
Teldor	0.15	0.5 b	2.9 b	9.4 b	46.0 ab			

^aAlternation of 0.15% Teldor (fenhexamide), 0.1% Rovral (iprodione) and 0.25% Mythos (pyrimethanil)

^aTreatments in each parameter followed by a common letter are not significantly different according to Fisher's protected LSD test.

P values for significance of major treatment factors and their combinations – number/m² of diseased plants

Whole plant			Plant stubs		
Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density
P=0.0001	P=0.0002	P=0.0029	P=0.0001	P=0.0042	P=0.3461 n.s.
Control	a	50 b	Control	a	50 b
Alternation	b	70 a	Alternation	b	70 a
Mythos	b		Mythos	b	
Teldor	b		Teldor	b	

P values for significance of major treatment factors and their combinations – percent of diseased plants

Whole plant			Plant stubs		
Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density
P=0.0001	P=0.0009	P=0.0121	P=0.0001	P=0.8527 n.s.	P=0.6950 n.s.
Control	a	50 b	Control	a	50
Alternation	b	70 a	Alternation	b	70
Mythos	b		Mythos	b	
Teldor	b		Teldor	b	

P values for significance of major treatment factors and their combinations – incidence of infected flowers

Incidence at day 115			AUDPC		
Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density
P=0.0092	P=0.0075	P=0.0592	n.s.	P=0.0683	n.s. P=0.0238
Control	a	50 b	Control	50 b	
Alternation	b	70 a	Alternation	70 a	
Mythos	b		Mythos		
Teldor	b		Teldor		

^aTreatments in each column followed by a common letter are not significantly different according to Fisher's protected LSD test; n.s. = not significant.

Table: Healthy plants left at the end of the first flower harvest in commercial greenhouse experiment 2005 2006 where two plant densities were initially planted and chemical sprays were carried out

	Percent healthy plants		Healthy plants (no./m ²)	
	50	70	50	70
Control	47.8±7.4	37.5±5.5	23.9±3.7	31.5±4.6
Alternation ^a	74.8±2.8	58.8±2.7	37.4±1.4	49.6±2.3
Mythos	0.25	74.6±7.6	68.5±4.8	37.3±3.8
Teldor	0.15	63.0±2.6	63.1±5.8	31.5±1.3
				53.0±4.9

P values for significance of major treatment factors and their combinations

% plants	Number of plants					
	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density
P=0.0195		P=0.0087	P=0.0592 n.s.	P=0.0383	P=0.0001	P=0.3211 n.s.
Control	a	50 a		Control	a	50 b
Alternation	b	70 b		Alternation	b	70 a
Mythos	b			Mythos	b	
Teldor	b			Teldor	b	

^aTreatments in each column followed by a common letter are not significantly different according to Fisher's protected LSD test; n.s. = not significant.

Effect of planting density and fungicides sprays on quantity measured as number of harvested flowers during the first flowering wave and quality of harvested flowers measured as flower length and weight and the number of buds in a single flower (values±SE).


	Flowers quantity (no./m ²)		Flower length (cm)		Buds (no./flower)		Flower weight (g)	
	50	70	50	70	50	70	50	70
Control	46.8±4.3	59.4±3.2	78.0±0.8	78.0±0.5	7.9±0.4	6.7±0.4	109.0±3.5	102.0±3.3
Alternation ^a	46.6±4.5	65.5±1.8	79.0±2.0	78.0±0.8	7.2±0.3	6.8±0.8	106.0±2.0	100.0±3.2
Mythos	0.25	50.5±4.5	61.7±3.5	79.0±0.8	77.0±1.8	8.1±0.9	7.0±0.1	116.0±4.1
Teldor	0.15	50.4±0.8	59.4±1.5	80.0±1.4	77.0±0.7	7.3±0.5	6.4±0.4	110.0±2.1
								101.0±3.0

P values for significance of major treatment factors and their combinations

Flowers quantity	Flower length					
	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density
P=0.6929		P=0.0001	P=0.3638 n.s.	P=0.9081	P=0.0914	P=0.6376 n.s.
Control	a	50 b		Control	a	50 a
Alternation	a	70 a		Alternation	a	70 a
Mythos	a			Mythos	a	
Teldor	a			Teldor	a	

Buds number	Flower weight					
	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent × plant density
P=0.3969		P=0.0111	P=0.8876 n.s.	P=0.1346	P=<0.0001	P=0.5416 n.s.
Control	a	50 a		Control	a	50 a
Alternation	a	70 b		Alternation	a	70 b
Mythos	a			Mythos	a	
Teldor	a			Teldor	a	


^aTreatments in each column followed by a common letter are not significantly different according to Fisher's protected LSD test; n.s. = not significant.



ציור 4.2 יבול גל I בניסוי הדבירה משולבת (עומד צמחים ותכشيرי הדבירה) של בוטריטיס בליזיאנטוס, חממה בחווות הבשור

טבלה 4.2: השפעת טיפול הניסוי על הופעת פרחים בגל הראשון (ימים מעתילה לקטיף) בניסוי הדבירה משולבת (עומד צמחים ותכشيرי הדבירה) של בוטריטיס בליזיאנטוס, חממה בחווות הבשור 2005-2006.

	70 למ"ר	50 למ"ר
היקש	92	95
אלטרניצית תכشيرים	93	98
מייטוס	93	95
טלדור	91	99
קלניט	98	



ציור 4.3: מחלות גל שני: הדבירה משולבת (עומד צמחים ותכشيرי הדבירה) של בוטריטיס בליזיאנטוס, חממה בחווות הבשור 2005-2006.


Table: Effect of planting density and fungicides sprays on quantity measured as number of harvested flowers during the second flowering wave and quality of harvested flowers measured as flower length and weight and the number of buds in a single flower (values \pm SE).

	Flowers quantity (no./m ²)		Flower length (cm)		Buds (no./flower)		Flower weight (g)	
	50	70	50	70	50	70	50	70
Control	82.0 \pm 11.4	79.0 \pm 13.6	105.0 \pm 2.8	103.0 \pm 2.3	13.4 \pm 2.2	15.1 \pm 1.1	135.0 \pm 12.2	147.0 \pm 5.4
Alternation ^a	119.0 \pm 7.2	125.0 \pm 11.7	107.0 \pm 2.2	107.0 \pm 1.4	10.3 \pm 0.8	12.0 \pm 0.6	112.0 \pm 7.5	124.0 \pm 5.3
Mythos	0.25	123.0 \pm 8.0	142.0 \pm 3.5	107.0 \pm 2.2	103.0 \pm 3.0	10.9 \pm 1.2	11.2 \pm 1.2	117.0 \pm 8.3
Teldor	0.15	111.0 \pm 5.0	132.0 \pm 11.5	110.0 \pm 1.3	102.0 \pm 1.9	10.8 \pm 1.1	11.0 \pm 0.7	119.0 \pm 1.4
	<i>P</i> values for significance of major treatment factors and their combinations							

Flowers quantity			Flower length		
Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent \times plant density	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent \times plant density
<i>P</i> =0.0002	<i>P</i> =0.0331	<i>P</i> =0.3448	<i>P</i> =0.6031	<i>P</i> =0.012	<i>P</i> =0.2497
Control	b	50 b	Control	a	50 a
Alternation	a	70 a	Alternation	a	70 b
Mythos	a		Mythos	a	
Teldor	a		Teldor	a	

Buds number			Flower weight		
Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent \times plant density	Control agent	Plant density (no./m ²)	Control agent \times plant density
<i>P</i> =0.0088	<i>P</i> =0.215	<i>P</i> =0.819 n.s.	<i>P</i> =0.0007	<i>P</i> =0.3477	<i>P</i> =0.3641 n.s.
Control	a	50 a	Control	a	50 a
Alternation	b	70 a	Alternation	b	70 a
Mythos	b		Mythos	b	
Teldor	b		Teldor	b	

^aTreatments in each column followed by a common letter are not significantly different according to Fisher's protected LSD test; n.s. = not significant.



ציור 4.4: יבול גל II בניסוי הדבורה משולבת (עומד צמחים ותכשירי הדבורה) של בוטרייטיס בליזיאנטוס, חמהה בחווות הבשרו

טבלה 4.5: מדדים להקדמת פריחה בשני גלי הקטיף בניסוי הדבורה משולבת (עומד צמחים ותכשירי הדבורה) של בוטרייטיס בליזיאנטוס, חמהה בחווות הבשרו 2005-2006

	שיעור הפרחים שנקטפו בקטין הראשוון (%)		שיעור הפרחים שנקטפו בgel הראשוון (%)	
	50	70	50 למ"ר	70 למ"ר
היקש	36.7	13.8	37.0	14.3
אלטרנטיבת תכשירים	29.0	10.0	29.3	10.0
מיתוס	28.2	12.9	28.4	13.0
טלדור	34.4	08.4	34.0	8.5
קלניט		11.2		11.2

בגל השני נקטפו הפרחים ארבעה קטיפים בתאריכים 28.5-11.6 והקדמת הפריה חושבה לתאריך הקטיף הראשון.

ניסוח 5: ניסוי חממות ללימוד השפעת חיפוי קרקע, איזורוח בתוך העורגה וטיפול כימי על תחולות לייזיאנטוס בברוטריפטיס בחותם הבשור (עונת 2006-2007)

Table 5.1: Effect of soil cover, in-bed aeration and fungicides sprays on the incidence of stem stubs infected in commercial greenhouse experiment 2006-2007. Incidence is expressed as AUDPC (no.×days) through 63 days (values \pm SE)


Soil cover Forced aeration Chemical agent

				Switch		Mythos	
-	-	481.0 \pm 37.7	a	A	116.9 \pm 25.8	a	B
-	+	271.7 \pm 65.2	b	A	146.0 \pm 40.1	a	B
+	-	374.3 \pm 83.5	ab	A	101.5 \pm 28.6	a	B
+	+	297.0 \pm 64.6	b	A	93.8 \pm 29.2	a	B


P-values for significance of major treatment factors and their combinations

Soil cover	Forced aeration	Chemical agent	Interactions	
P=0.0572	P=0.0325	P=0.0002		
- a	- a	- a	Soil cover \times Forced aeration	P=0.0787
+ a	+ b	Switch b	Soil cover \times Chemical agent	P=0.0451
		Mythos b	Forced aeration \times Chemical agent	P=0.0375

Treatments in each column followed by a common lower case letter and numbers in each row followed by a common capital letter are not significantly different according to Fisher's protected LSD test.



צירור 5.1: השפעת חיפוי קרקע ואיזורוח מואלץ על תנאים מיקרואקלים: טמפרטורה (ימין), לחות יחסית (שמאל), המדידה החלה בשעה 00:24.



צירור 5.2: השפעת חיפוי קרקע ואיזורוח מואלץ על רטיבות הקרקע. המדידה החלה בשעה 00:24.

Table 5.2: Effect on quantity and quality of flowers in wave 1 and quantity of flowers in wave 2.

Soil cover	Forced aeration	Chemical agent	First wave			Second wave	
			Flower quantity (no./m ²)	Flower length (cm)	Buds (no./flower)	Flower weight (g)	Flower quantity (no./m ²)
-	-	-	44.0±2.7	82.1±1.2	6.38±0.29	101.2±4.0	115.6±5.0
		Switch	53.4±3.6	84.6±1.0	6.71±0.18	98.9±5.0	128.1±19.9
		Mythos	42.1±1.8	82.0±1.9	6.36±0.17	96.4±5.5	104.7±4.1
	+	-	49.0±1.9	83.5±0.7	6.95±0.32	101.8±4.3	122.1±22.1
		Switch	48.9±1.0	84.5±0.7	7.13±0.13	99.0±2.9	124.6±15.0
		Mythos	45.5±3.2	83.4±1.5	6.99±0.08	99.7±3.9	104.1±9.9
+	-	-	49.4±2.8	81.7±0.5	7.98±0.35	121.4±2.2	135.9±15.4
		Switch	52.7±1.7	81.5±0.9	8.58±0.43	120.7±4.3	163.2±10.3
		Mythos	42.0±1.8	82.0±1.9	6.36±0.17	96.4±5.5	140.0±6.2
+	+	-	48.9±3.1	81.6±1.6	7.91±0.29	116.4±3.9	134.0±6.0
		Switch	49.4±3.6	83.1±1.9	8.46±0.31	119.2±1.7	141.2±6.1
		Mythos	52.8±2.1	81.8±1.1	7.38±0.24	113.2±3.5	121.2±8.1

P values for significance of major treatment factors and their combinations

Flower quantity first wave

Soil cover P=0.0322	Forced aeration P=0.0225	Chemical agent P=0.0112	Interactions
- b	- b	- b	Soil cover×Forced aeration P=0.0527
+ a	+ a	Switch a	Soil cover×Chemical agent P=0.0631
		Mythos b	Forced aeration×Chemical agent P=0.1148

Flower length first wave

Soil cover P=0.0972	Forced aeration P=0.0625	Chemical agent P=0.0772	Interactions
- a	- a	- a	Soil cover×Forced aeration P=0.0722
+ a	+ a	Switch a	Soil cover×Chemical agent P=0.0681
		Mythos a	Forced aeration×Chemical agent P=0.0475

Buds number first wave

Soil cover P=0.0122	Forced aeration P=0.0225	Chemical agent P=0.0442	Interactions
- b	- b	- a	Soil cover×Forced aeration P=0.0681
+ a	+ a	Switch a	Soil cover×Chemical agent P=0.0658
		Mythos b	Forced aeration×Chemical agent P=0.0992

Flower weight first wave

Soil cover P=0.0172	Forced aeration P=0.0629	Chemical agent P=0.0992	Interactions
- b	- a	- a	Soil cover×Forced aeration P=0.0687
+ a	+ a	Switch a	Soil cover×Chemical agent P=0.0771
		Mythos a	Forced aeration×Chemical agent P=0.0885

Flower number second wave


Soil cover P=0.0592	Forced aeration P=0.0678	Chemical agent P=0.0092	Interactions
- b	- a	- b	Soil cover×Forced aeration P=0.0887
+ a	+ a	Switch a	Soil cover×Chemical agent P=0.0751
		Mythos b	Forced aeration×Chemical agent P=0.0975

טבלה 5.3: מדרדים להקדמת פריחה בשני גלי הקטיף בניסוי חסימות ללימוד השפעת חיפי קركע, איוורורות בתוך העורגה וטיפול כימי על תחלואה ליזיאנטוס בבטוריטיס בחוות הבשור (עונת 2006-2007)


	שיעור הפרחים בגל ראשון		שיעור הפרחים שנקטפו בקטיף (%) מכל הפרחים)	שיעור הפרחים שנקטפו בקטיף (%) הראשון של הגל השני (%)	שיעור חיפוים של הגל השני (%)
	לא חיפי	עם חיפי			
לא איוורור	36.8	4.8	69.7	47.8	27.6
לא איוורור	54.9	8.0	67.6	59.0	25.1
לא איוורור	38.7	10.4	60.0	52.0	26.8
איוורור מאולץ	37.8	0.0	73.6	65.0	27.6
איוורור מאולץ	38.3	24.5	73.9	73.1	27.1
איוורור מאולץ	34.6	23.0	75.2	67.8	31.5
					32.2

בגל הראשון נקטפו הפרחים בשיטה קטיפים בתאריכים 10.1-13.2 ושיעור הפרחים המזדים חושב לשני המועדים הראשונים, עד 15.1.07. בгал השני נקטפו הפרחים בשבועה קטיפים בתאריכים 30.5-11.6 והקדמת הפריחה חושבה לתאריך הקטיף הראשון.

ניסוח 6: ניסוי מנהרות עבירות בחוות הבשור ללימוד השפעת חיפי קركע ומספר השורות בעורגה בשני זנים של ליזיאנטוס (עונת 2007-2008)



צייר 6.1: השפעת חיפי קركע על תחלואה בווירוס TMV ב-11.11.07 בניסוי מנהרות עבירות בחוות הבשור.




ציר 6.2: שכיחות עשב אפור המtabטא בתמונות צמחים מהם נקטפו פרחים בגל הקטיף הראשון בחרוזת הבשור בו נבדקו חיפוי קרקע ומספר השורות בערוגה בשני זנים של ליזיאנטוס. בגל מיקום שונה של הזרעים מביניהם לא ניתן להשוות ביניהם. חור השתילה ביריעת החיפוי היה גדול. סיכום התחלואה והיבול מפורט בטבלה העוקבת.

טבלה 6.3: שכיחות עשב אפור המtabטא בשיטה מתוח לעקומות התפתחות המוללה (תמותה צמחים מהם נקטפו פרחים בגל הקטיף הראשון, תואר בגרף שלעיל) בגל הראשון, כמות ואיכות היבול בגל הראשון ובגל השני, בניסוי במנזרות עבירות בחרוזת הבשור בו נבדקו חיפוי קרקע ומספר השורות בערוגה בשני זנים של ליזיאנטוס. בגל מיקום שונה של הזרעים מביניהם לא ניתן להשוות ביניהם. חור השתילה ביריעת החיפוי היה גדול.

First wave	Gray mold						Yield
	Rows in bed	Soil polyethylene cover	Incidence (AUDPC, no.×days)	Flower quantity (no./m ²)	Flower length (cm)	Flower buds (no./flower)	
ABC blue	6	-	48.3±6.6	17.2±4.5	72.1±5.2	3.27±0.77	46.4±6.78
ABC blue	4	-	91.0±40.6	15.5±0.9	72.4±4.0	3.58±0.56	46.1±7.30
ABC blue	6	+	154.3±27.4	24.3±2.6	88.2±3.4	5.53±0.42	68.6±6.23
ABC blue	4	+	165.2±27.8	36.8±4.4	88.0±0.6	6.02±0.13	66.1±0.42
ABC Rose	6	-	204.6±67.2	29.3±4.2	91.2±0.5	6.03±0.35	80.3±6.8
ABC Rose	4	-	259.6±32.0	38.8±8.1	88.4±3.8	5.50±0.38	73.2±1.9
ABC Rose	6	+	170.5±76.6	39.5±10.2	89.4±5.6	6.72±0.32	76.6±12.7
ABC Rose	4	+	260.5±56.7	48.1±5.9	86.0±7.0	6.73±0.25	63.0±14.7
Second wave							
לא נבדק							
ABC blue	6	-	62.3±8.0	107.0±5.1	10.93±0.92	94.7±5.6	משקל 90 ס"מ
ABC blue	4	-	46.5±2.3	107.8±2.8	10.17±0.93	97.5±7.7	
ABC blue	6	+	61.3±14.0	107.5±0.8	10.78±1.34	103.1±10.5	
ABC blue	4	+	65.7±9.2	113.1±0.5	11.50±1.08	110.5±14.1	משקל כל הפרה
ABC Rose	6	-	89.5±8.6	103.9±2.4	11.12±0.85	107.4±6.5	
ABC Rose	4	-	74.8±1.9	104.2±5.3	10.73±0.93	101.3±14.2	
ABC Rose	6	+	86.7±6.9	105.9±3.6	11.23±0.62	109.5±4.7	
ABC Rose	4	+	129.8±6.8	96.8±6.6	12.15±0.93	88.2±7.1	


**נספח 7: ניסוי בחממות בחוות הבשר בו נבדקו חיפויי קרקע, אודור ותזונת השוורות, גודל חור השתילה ביריעת החיפוי
והסדרת עליים תחתוניים (עונת 2007-2008)**



7.1: שכיחות עובש אפור המתבטאת בתמות צמחים מהם נקטפו פרחים בגל הקטיף הראשון בניסוי בחממות בחוות הבשר בו נבדקו חיפוי קרקע, אוורור בתוך השורות, גודל חור השטילה ביריעת החיפוי והסרת עליים תחתוניים (אותיות הטיפוליים מציניות את הטיפוליים כפי שמצווט בटבלה העוקבת. הטיפול הכימי כלל את התכשירים במועדים הבאים: 3/12/07, 17/1/08, 3/1/08, 21/12/07, 3 מיטו, 5/2/08, 17/1/08, 3 סוויץ, 19/11/07, 8/8/07, 27/11/07, סוויץ, 19/11/07, סוויץ, 27/11/07.

טבלה 7.1: השפעת חיפוי קרקע, אוורור בתוכן השורות, גודל חור השטילה ביריעת החיפוי והסרה עליים תחתונים על שכיחות עובש אפור, המתבטאת בתמונות צחיחות מכם נקטפו פרחים בגל. הקטיף הראשוני, כמוות ואיכות היבול בניסוי בחממות בחוות הבשור עונת 2007-2008.

טיפול	Gray mold			Yield					
	Disease incidence (AUDPC no./m ² *days)	Flower quantity (no./m ²)	Flower length (cm)	Buds (no./flower)	Flower weight (g)				
	hurst	נור	טיפול	גודל	כימי חיפוי אוורור	עלים	חור		
A	-	-	-	-	284.1±12.9	57.3±0.5	91.4±1.8	5.61±0.20	59.0±2.4
B	-	-	-	+	139.3±6.3	57.9±1.5	90.0±0.8	5.33±0.32	57.1±4.1
C	-	-	רגיל	-	37.2±1.7	56.1±1.9	92.8±1.0	5.88±0.49	64.7±4.6
D	-	-	רגיל	+	133.5±6.1	51.8±0.6	90.7±1.6	6.30±0.00	70.9±2.7
E	-	-	לגדם	-	39.2±1.8	54.5±3.7	92.5±1.2	6.35±0.19	65.9±3.0
A+	+	-	-	-	141.0±6.4	58.6±3.1	91.6±2.4	5.89±0.07	67.9±1.7
B+	+	-	-	+	139.6±6.3	61.5±1.0	93.5±2.1	5.51±0.16	66.1±2.6
C+	+	-	רגיל	-	35.8±1.6	58.4±0.4	93.5±1.9	6.11±0.12	68.9±3.2
D+	+	-	רגיל	+	77.0±3.5	55.4±0.8	91.9±3.3	5.78±0.09	65.6±5.1
E+	+	-	לגדם	-	47.7±2.2	55.6±2.1	92.0±1.4	5.96±0.12	67.4±1.1
F	-	+	קטן	-	35.8±1.6	56.1±0.4	92.7±1.5	6.26±0.15	70.3±3.7
G	-	+	גדול	-	120.0±5.5	58.1±0.7	94.3±1.4	6.25±0.09	71.9±3.3
H	-	+	קטן רגיל	-	28.5±1.3	56.5±0.2	94.3±1.2	6.50±0.13	72.8±1.0
I	-	+	קטן לגדם	-	26.6±1.2	50.3±3.1	90.7±1.4	6.26±0.34	69.6±4.8
F+	+	+	קטן	-	29.3±1.3	55.0±1.7	92.4±1.5	6.23±0.32	70.2±3.3
G+	+	+	גדול	-	81.3±3.7	57.0±1.1	92.3±1.5	6.16±0.19	67.9±3.6
H+	+	+	קטן רגיל	-	25.6±1.2	54.0±3.3	92.5±2.1	6.14±0.24	71.6±3.7
I+	+	+	קטן לגדם	-	7.3±0.3	54.4±2.3	92.2±1.0	6.39±0.21	75.4±1.3



צייר 7.2: שכיחות עובש אפור המתבטאת בתמונות צמחים בגדל הפריחה השני בניסוי בחוממות הבשור בו נבדקו חיפויי קركע, אוורור בתוכן השורות, גודל חור השתילה ביריעת החיפוי והסרת עלים תחתונים (אותיות הטיפולים מצינינות את הטיפולים כפי שפורסם בטבלה העוקבת. הטיפול הכימי כלל את התכשירים במועדים הבאים: מיתום 18/3/08, סווץ 3/3/08, טולדו 20/2/08, מיטו 3/3/08. העוקבת.

טבלה 7.2: השפעת חיפויי קركע, אוורור בתוכן השורות, גודל חור השתילה ביריעת החיפוי והסרת עלים תחתונים על שכיחות עובש אפור, המתבטאת בתמונות צמחים מהם נקטפו פרחים בגדל הקטיף השני, כמות ואיכות היבול בניסוי בחוממות בחוזות הבשור עונת 2007-2008.

טיפול	Gray mold			yield			Flower weight (g) (90 cm flower length)	
	הסרת עלים	גודל chor	טיפול כימי חיפוי אוורור	Disease incidence (AUDPC no./m ² *days)	Flower quantity (no./m ²)	Flower length (cm)		
				GRAY MOLD	FLOWER QUANTITY	FLOWER LENGTH	BUDS (NO./FLOWER)	
A	-	-	-	417.9±40.8	140.2±6.6	127.9±0.9	6.46±0.40	72.5±3.4
B	-	-	+	104.3±12.3	131.0±12.1	125.9±2.8	6.89±0.53	80.2±4.5
C	-	ריגיל	-	293.2±28.6	159.8±7.6	129.2±3.0	7.35±0.19	78.3±2.4
D	-	ריגיל	+	127.7±19.0	140.5±3.2	130.4±2.2	7.08±0.05	75.6±0.4
E	-	לגדם	-	207.2±26.0	164.2±3.7	126.9±3.2	6.65±0.47	76.9±6.5
A+	+	-	-	206.7±27.8	132.8±9.2	128.1±4.6	7.59±0.38	88.7±3.9
B+	+	-	+	45.4±7.0	136.1±16.6	125.1±2.7	7.13±0.26	80.8±2.8
C+	+	ריגיל	-	173.0±21.3	166.1±10.4	127.5±2.9	7.04±0.14	76.0±1.9
D+	+	ריגיל	+	19.2±3.6	151.6±19.3	126.0±1.9	8.25±0.42	86.4±3.4
E+	+	לגדם	-	143.7±17.4	150.1±8.3	126.6±4.1	7.30±0.31	82.4±3.3
F	-	+	קטן	107.9±1.4	153.6±9.6	129.1±1.5	6.52±0.37	73.9±2.3
G	-	+	גודל	253.2±21.5	140.9±9.6	132.3±2.9	8.26±0.17	86.2±2.1
H	-	+	ריגיל	113.4±12.9	161.9±8.9	131.9±1.2	6.63±0.41	71.2±4.3
I	-	+	קטן לגדם	158.5±21.3	150.6±15.1	127.6±2.6	7.41±0.15	81.7±3.0
F+	+	+	קטן	67.3±17.5	145.1±4.4	130.4±1.6	7.33±0.38	81.1±3.7
G+	+	+	גודל	67.9±13.5	143.9±13.4	127.8±3.3	8.35±0.48	92.2±3.6
H+	+	+	ריגיל	41.3±9.0	160.2±9.5	126.1±3.4	7.71±0.14	88.1±1.8
I+	+	+	קטן לגדם	187.7±24.7	141.0±12.9	126.9±3.7	7.34±0.37	86.3±5.6


טבלה 7.3 : מדדי הקדמת יבול בגול הפריחה הראשון והשני בნיסוי בחמות הבשור בו נבדקו חיפויי קרקע, אוורורו בتوزן השורות, גודל חור השתילה ביריעת החיפוי והסרת עליים תחנות (עונת 2007-2008)

איוורור	חיפוי	ריסוס	גודל חור	עלים	שול הגול הראשון (%)	מכל הפרחים בוענה (%)	שיעור הפריחה השני (26.11.07) (%)	שיעור הפריחה הראשון (%) בקטיף השני (25.5.08)	שיעור הפריחה הראשון (%) בקטיף הראשון (26.11.07) (%)	חלק הפרחים בגל הראשון (%) בקטיף השני	הסרת עלים
36.2		29.0	26.8	-	-	-	-	-	-	-	-
33.3		30.6	38.1	-	-	-	-	-	-	-	+
29.7		30.7	27.1	+	-	-	-	-	-	-	-
31.3		31.1	42.1	+	-	-	-	-	-	-	+
29.5		26.0	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
26.8		26.0	32.7	-	-	-	-	-	-	-	+
41.9		26.9	28.0	+	-	-	-	-	-	-	-
36.8		26.8	36.0	+	-	-	-	-	-	-	+
38.7		24.9	31.7	-	-	-	-	-	-	-	-
32.9		27.0	38.9	-	-	-	-	-	-	-	+
36.7		26.8	38.8	-	-	-	-	-	-	-	-
27.7		27.5	27.6	חור קטן	-	-	-	-	-	-	+
35.9		29.2	38.3	חור גדול	-	-	-	-	-	-	+
19.1		28.4	32.1	חור גדול	-	-	-	-	-	-	+
25.0		25.9	38.9	חור קטן	-	-	-	-	-	-	-
20.0		25.2	28.7	חור קטן	-	-	-	-	-	-	+
40.0		25.0	29.0	�מי לדם	חור קטן	-	-	-	-	-	-
26.6		27.8	25.6	�מי לדם	חור קטן	-	-	-	-	-	+

בגול הפריחה הראשון נקטפו הפרחים מ 18.11.07 עד 3.1.08 בחמשה קטיפים.

בגול הפריחה השני נקטפו הפרחים מ 1.6.08 עד 25.5.08 בשלושה קטיפים.

נספח 8: היישרדות מדבק



ציור 8.1 : חיות קשיות וקטעי גבעול בתנאי קיז. המדבק נתמן בעומק 10 ס"מ בקרקע בחמות הבשור ונדגם עד אוקטובר (למעטה) או נתמן ונחשה לחיטויי קרקע בחמות הבשור (ימין למעלה) ובתחנת זהר בככר סדום (שמאל למעלה).

