

הוראות למלחמה בזבוב הבית במשקים הגדולים בארץ*.)

הזבובים הם אחת המכות הקשות והמכבידות ביותר בכפר. הם גוזלים את מנוחתו של העובד בשעות הצהריים, בשעת האוכל והשנה, למותר גם להזכיר כמה מסוכנים הם הזבובים בתור מעבירי מחלות, כגון: טיפוס ודיוזנטריה. כבר בימים הקדמונים תפס "בעל-הזבוב" אליל הזבובים והנהיגם, טקום מיוחד באמנת העמים השמיים.

1) מיני זבוב הבית בארץ:

זבוב הבית השכיח ביותר בארץ הנהו הזבוב הקיסמופוליטי *Musca domestica* L. מלבדו שכיחים עוד מסוג הזבובים שאינם עוקצים: *Musca nebulosa* Fab., *Musca autumnalis* de Geer, *Cyrtoneura stabulans* Fab., *Muscina pabulorum* Flu., *Calliphora erythrocephala* Mg., *Chrysomya albiceps* Wied., *Chrysomya marginalis* Wied., *Lucilia sericata* Mg., *Lucilia nobilis* Mg. מהזבובים העוקצים (מוצצי הדם) מוצאים בארץ: *Philaematomyia crassirostris* Stein, *Philaematomyia lineata* Brunetti, *Stomoxys calcitrans* L., *Lyperosia irritans* L.

2) הביולוגיה של זבוב הבית:

כל הזבובים הנ"ל מטילים את ביציהם בזבל בהמות טרי (מקצתם גם בבשר רקוב); התולעים (הזחלים) מתפתחים בתוך הזבל. הביצים לבנות, ארכן 1-2 ס"מ, הן

* עלון זה מאת מחלקת ההדרכה של תחנת-הנסיין החקלאית (בקצורים קלים).

צרות מאד, לרוב כפופות לצד אחר, כעבור 24—12 שעות בוקעים מתוכן וחלי הזכוכים הצעירים, צבעם לבן, צורתם מחודדת מלבנים, רחבה ושטוחה מאחור, ראש אין להם, על יד הפה יש להם שערות דקנות הזקות אחרות, כובל טרו מוצאים אלפי תולעים אלה, קבוצות — קבוצות.

כעבור ארבעה — ששה ימים מתחילות התולעים לצאת את הובל והן מתגלמות סחוצה לו לנוחם קטן, אדום-חום; ממנו בוקעים בקיץ, כעבור 8—5 ימים, הזכוכים הבוגרים. בחורף נמשכת תקופת ההתפתחות הזאת הרבה יותר, הזכוכים רבוקעים מתחילים, כעבור ימים עד שלשה שבועות (לפי הטמפרטורה בחוץ), להטיל את ביציהם, זמן ההתפתחות הכי קצר בקיץ הוא 8 ימים.

(3) המקום שמתפתחים בו הזכוכים:

מקום ההתפתחותם העיקרי של הזכוכים הוא זבל הבחנות והסוסים, את זבל הכוסים מעדיפים הזכוכים על האחרים, באורוות סוסים שבקרבת הבתים, אם אין מנקים את זבלן לפחות אחת לשבוע, יש לראות את המקור הראשי למכת הזכוכים, מסוכנות בטובן זה גם ערמות הובל והאשפה, ביוחד אם הן נמצאות בקרבת הבתים, מצאנו שההתפתחות המינימלית של הזכוכים בערמות הובל היא 12,500 למטר מעוקב, מכיון שבמשקים הגדולים מוציאים לערמת הובל מאחר עד שני מטר מעוקבים זבל כיום, אפשר על נקלה למצוא את מספר הזכוכים המתפתח כאן יובדיום (25,000).

הזכוכים מתפתח רק כובל הטרי, כשהובל הוא בן 1—2 חדשים, והוא יבש אינו משמש יותר כמור כביבה להתפתחות הזכוכים, את ערמות הקומפוסט והאשפה המוטלות בחצר יותר משבוע ימים אפשר להעריך כמקור לזכוכים, כמו ערמות הובל והאורוות שאין מנקים אותן בקביעות, לעומת זאת משמש זבל עופות כמקום להתפתחות לזכוכים רק במדה מועטה, הובל הערבי אינו בא בהחלט בחשבון.

(4) השיבותה של הרחקת מקום התפתחות הזכוכים מהדירות:

הזכוכים מתפשטים לכל הצדדים מסביב למקום התפתחותם וכיחוד כמון רוח, הם מסוגלים לעוף מרחק של קילומטרים אחדים, כדי לבאר את השפעת המרחק שבין מקום התפתחות הזכוכים והבית על התפשטות הזכוכים נבחר בדוגמה הבאה:

הדר האוכל והמטבח (המקומות המושכים ביותר את הזכוכים אליהם) פונים כחיות שארכה כ-10 מטר, לצד שממנו באו הזכוכים, הזכוכים מתחלקים באופן כזה בכל חלק וחלק מהשטח, אולם הדר האוכל והמטבח סוגרים על הזכוכים את הדרך כמשנם את הזכוכים העוברים אליהם, באופן זה מתאספים רוב הזכוכים במקומות האלה, את הפרטים אפשר לקרוא בטבלה הבאה:

המרחק בין הבית ומקור הזכוכים במספר'	מספר הזכוכים בבית	המרחק בין הבית ומקור הזכוכים במספר'	מספר הזכוכים בבית
0	0	300	625
50	4000	400	560
100	2000	500	375
150	1250	1000	250
200	1000		

כהנחה יסודית לקחנו את המספר של 12,500 זבובים למטר מעוקב של זבל (מספר שמצאנו בספירותינו).

מהטבלה אפשר לראות שחוק התקפת הזבובים הולך וגדל עם התקרבות מקום התפתחותם (ערמת הזבל, אורוח) לבית. לדוגמה נבחר את היחסים השוררים בהנחה א': מרחק בור הזבל הגדול מהבתים הוא 150 מטר. אם נקח בחשבון באופן ממוצע 10 ימי חיים לכל זבוב, אזי נמצאים בתוך השטח הזה באופן קבוע 12500 זבובים, ומהם רובם הגדול בתוך החדרים.

מלבד זה מתפתחים הזבובים גם באורוח, ביהוד אם אין מנקים אותה במדה מספיקה. אם כמות הזבל ליום היא $2/10$ מטר מרובע ואם נקח בחשבון שמספר הזבובים המתפתחים בזבל כפול הוא כפול מזה שבזבל הפרות (25000 למטר מעוקב) נמצא בתוך השטח הנ"ל במרחק של 20 מטר 4000 זבובים, במרחק של 10 מטר 8000 זבובים, מזה יוצא שהאורוח הנמצאת בקרבת הבית משפיעה על מספר הזבובים בחדרים כמעט באותה המדה כמו ערמת הזבל הנמצאת במרחק של 150 מטר.

5) השיבותו של סדור בית הכסא:

מצד ההיגיוני חשוב לדעת שבשום מקרה לא מצאנו עדין, כי בית הכסא ישמש מקום התפתחות לזבובים, חשוב גם לדעת, כי במקום שדואגים להאפלת בית הכסא במדה מספיקה נמצאים בתוכו זבובים במדה מעטה מאד, עד כי אינם כלל בחשבון כמעכוריהם של מעוררי המחלות, רק בתי-הכסא המונוחים ביותר הם מקור לסכנה.

6) העדרת כלליות למלחמה בזבובים:

המלחמה הכי רדיקלית בזבובים מכוונת להשמדת החלים במקום התפתחותם, אולם נסיונותינו בנידון זה לא הביאו עדיין לתוצאות מעשיות, הנסיונות הללו הולכים ונמשכים עוד. ככל וזאת, למרות הספקות שהיו לנו קודם הראו נסיונותינו אשתקד בהנחה, שגם מלחמה ישירה בזבובים בדירות זכבתים יכולה להביא תוצאות טובות, אם המשקים יוציאו לפועל את ההוראות הבאות באופן סתמיר ובדיוק אפשר יהיה להפחית את התפשטותם של זבובי הבית עד למדה השכיחה בכל העולם.

הוראות למעשה:

התנאים המשתנים ממקום למקום אינם מרשים לתת הוראות מפורטות המתאימות לכל המקומות. באופן כללי אפשר לציין את האמצעים הבאים:

א. סדור ערמת הזבל:

המרחק המינימלי בין ערמת הזבל ורבתים הוא 150 מטר. אם רק אפשר, צריך להרחיק את הערמה מן הבית ב-300—500 מטר. מרחק קטן מזה מסכן מראש את הצלחת המלחמה. מכיון שברוב המשקים מתאים סדור הבנינים גם כיום להרישה זו, אפשר בצדק לדרוש גם מותר המשקים שימלאו אחרי הדרושה הזאת, בכל משק גדול מוציאים לפחות עגלה אחת וזבל ליום ואין הבדל רב ביחס לעבודה, אם העגלה עוברת מרחק של 50—150 או 300 מטר, השיבות מכרועה בשביל סדור ערמת הזבל ישנה

לכונן הרוח. הערמה צריכה להיות במקום שהרוח הנושבת במשך היום, ביחוד בשעות הבוקר, מטה את הזבובים במעופם מהכנינים והלאה.

ב. זבל אורזה והאשפה:

לכל הפחות פעמים בשבוע צריך לנקות את זבל האורזה. בעוד שכרפתות רגילים להוציא את הזבל יום יום, מונח הוא באורזות סוסים, החשובות מאד בשביל התפתחות הזבובים, לפעמים גם שבועות שלמים, ובעבור 8 ימים מתבקעים כבר הזבובים הראשונים. כמו כן צריך להרחיק מהחצר את ערמות הקומפוסט, והאשפה מהמטבחים וכיוצא בזה. לכל הפחות פעם או פעמים בשבוע.

ג. בית הכסא:

בית הכסא צריך להכנות לכל הפחות במרחק של 20 מטר מהכנינים. צריך לבנותו מוצק בלי סדקים המרשים לזבובים לחדור לתוכו. גם הכנין עצמו צריך להיות בלי סדקים כדי שלא יחדור אור פנימה.

ד. האורזה:

בתוך האורזה כדאי לתלות במקום מתאים את מלודרת הזבובים לפי שיטת ביושפ. ה. הדירות שבהם התפשטו הזבובים במדה רבה; (חדר האוכל, מטבחים). למקומות אלה יתאימו מאד המלכדות של ביושפ (התערובת: 15 חלקים פורמלין, 25 חלקים חלב, 60 חלקים מים. צריך לשים לב שיהיה תמיד בצורת נוזל!), אם מלכדות לא לכדה כבר ביום הראשון המוני זבובים — צריך להחליף את מקומה. את המלכדת צריך לתלות במקום מואר באור בינוני (לא באור מלא וגם לא בחושך) וגם בטובה בינוני. כמו כן אל לתלותה במקום שרוח פרצים מנשבת. במקום שאין מלכדת, או בתור השלמה לפעולותיה, אפשר בערבים, בזמן שהזבובים יתישבו בהמונים במקום מנוחתם לזרוק עליהם, בעזרת מורקטיד, תמיסת קריווליסבון של 5% את הזבובים הנפלים אוספים כמטאטא ומשרים אותם משך הלילה בפה מים, יכי הקריווליסבון מהםם אותם ואינו ממותם. על הזריקות הללו צריך לחזור יום יום או לפחות אחד ליומים או לשלושה ימים. אם מפסיקים את הזריקות מופיעים הזבובים מחדש. מחיר פה קריווליסבון 117 ג'מ. פה אחד מספיק להרשים אחדים. תמיסה בת 5 אחוז מכינים באופן כזה: טבניסים לתוך פה ליטר אחד תמיסת קריווליסבון ולזה מוסיפים את כמות המים הדרושה (19 ליטר). התמיסה הזאת מוכנה לשמוש ויכולה לשמש ימים אחדים מבלי להתקלקל. תמיסת קריווליסבון מוכנה אפשר לקבל בבית-החרושת של ד"ר יבנקין ת"א.

ז. דירות שהזבובים בהן מעטים:

פה סביא פוזר אבקת פוריסרום או קאטול לידו תוצאות טובות. צריך לשים לב שהאבקות תהיינה חרשות וטובות. אמצעי פשוט וטוב הוא דבק-זבובים (אפשר לקבל אצל יבנקין ת"א בשם "פלינט", מחיר קופסא 6 ג'מ). את הדבק מושהים בשכבה דקה מאד על גבי ניר כהיר לבן או צהוב כהיר. את הניר פורשים במקומות מספר בחדר. לא רצוי לתלות את הניר, כי הדבק מטפף ומלכלך את החדר. אפשר גם

להעמיד בחדר קערה גדולה ושטוחה עם תמיסת ארסין וסוכר או חלב עם פורמלין.
אם החדר סגור לגמרי נשמדים במשך הלילה כל הזבובים הנמצאים בו. צריך לנהוג
זהירות בתמיסות הללו כי הן רעל, ביחוד לילדים ולבהמות הבית.
תועלת מרובה מביאות הרשתות בחלונות ובדלתות. צריך רק לשים לב שהחלונות
והדלתות לא תהיינה פתוחות בזמן שהשמש זורחת עליהם. אם נוהגים לפי האמור,
יהיו החדרים השטורים ע"י רשתות הפשים כמעט לגמרי מזבובים, הזבובים אינם אוהבים
לשהות בחדרים אפלים, כמו כן הם בורחים מפני כל רוח פרצים.
באמצעים הנ"ל אפשר להקטין את מכת הזבובים במשקים הגדולים בעזרת הוצאות
קטנות עד למדה השכיחה בכל העולם. אולם הדרושה היסודית הוא שכל המשקים
ישתמשו באמצעים הללו באופן מדויק ומתמיד.
בכפרים בעלי המשק הזעיר, במקום שמקורות הזבובים מפוזרים, אופן המלחמה
מסובך וקשה הרבה יותר. נסיונותינו בזה עוד טרם נסתימו.

ד"ר פ. ש. בודנהימר,
המחלקה לאנטומולוגיה של תחנת-
הנסיון החקלאית.