

2001-2003

תקופת המחקה :

255-0627-03

קוד מחקר :

Subject: FLOWERING AROMATIC PLANTS AS A NEW ORNAMENTAL PRODUCT

Principal investigator: NATIV DUDAI

Cooperative investigator: ZIVA GILAD, MEIR SHIMON,
ELI PUTIEVSKY, SONIA PHILOSOPH-HADAS,
GABRIEL TSUBERI, JOSEPH MOSHE, Eli Matan

Institute: Agricultural Research Organization (A.R.O)

שם המחקה: פיתוח גידול צמחי תבלין כפרחי
קטיף

חוקר הראשי: נתיב דודאי

חוקרים שותפים: זיווה גלעד, שמעון מאיר,
אליהו פוטיבסקי, סוניה פילוסוף-חדרס, גבריאל
צוברי, יוסף משה, אליל מתן

מוסד: מינהל המחקר החקלאי, ת.ד. 6 בית דגן
50250

תקציר

מטרת התכנית היא לאתר ולבחון פוטנציאל של צמחי תבלין לשימוש כגידול לכפרחי קטיף. בניית עיר קיים אוסף גדול של צמחי תבלין. הטיפוסים אשר בידינו אמינים מותאמים לגידול בתנאי הארץ, אך הם לא נבדקו עדין במסגרת מיפוי כגידול לכפרחי קטיף. במסגרת העבודה נבחנת האפשרות לפתח טיפוסים המתאימים לשימוש כפרחי קטיף ריחניים. בשנה הראשונה הושאו כל המינים באוסף בנובה עיר לפריחה (עד עתה נהוג ל��רם צמחי תבלין). במקבב שנערך בשיתוף עם אנשי מקצוע בענף הפרחים נבחרו המינים העיקריים להמשך העבודה: זני בזיל (Ocimum basilicum), מיני אורגנו (Rosmarinus sp.), מרווה (Origanum sp.), אכילה (Salvia sp.), רוזמרין (Achillea sp.) ועוד. בسنة השנייה נבחרו המינים העיקריים העיקריים שנבחרו לאחר תוצאות השנה הראשונה להמשך העבודה: זני בזיל (Ocimum basilicum), מרווה (Origanum sp.), אכילה (Salvia sp.), רוזמרין (Rosmarinus sp.) ועוד. נערך ריבוי ואיתור הדרישות הפיזיולוגיות לפರיחה של המינים הנבחנים. בניסויים בפייטוטרונות נבחנו הדרישות לפರיחה של שתת המינים ותגובהם לאורך יום בטמפרטורות השונות. במקביל נערך ריבוי של המינים והטיפוסים הנבחנים. בשנה השנייה והשלישית נשתלו חלקות ניסוי של כמה מהם לתצפית ראשונית במיפוי דרום. המינים שהועברו למיפוי דרום נשתלו בחממות תצפית בגידול חד שנתי כנהוג בענף הפרחים.

בשנה השלישית בוצעו גם בדיקות חי האגרטל של המינים הנבחנים. לפני התוצאות, התבליינים שנבחנו אינם מתאימים לגידול בשיטות אלה ויש לבחון את גידולם בשטח פתוח או תחת רשת ברד.

דו"ח מסכם לתוכנית מחקר מס' 03-0627-255
פיתוח גידול צמחי תבלין כפרחי קטיף ריחניים ליצוא
Development of Aromatic Plants as Ornamentals
מוגש לקרן המזען הראשי של משרד החקלאות

מגישיים:

נתיב דודאי ואלי פטייבסקי - היחידה לצמחי תבלין ובושים, נווה יער היחידה לצמחי תבלין
ובושים, מנהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר נווה יער, ת.ד. 1021 רמת ישע 30095
אלימtan, תחנת מחקר בשור, מואפ' דרום, ד.נ. נגב 85400
גבי צובר, תחנת ניסיונות יairo, ד.נ. עמק הירדן.
זיווה גלעד, תחנת ניסיונות צבי, ד.נ. עמק הירדן.
משה יוסף, שח"ס, משרד החקלאות, באר שבע
סוניה פילוסוף-הדים ושמעון מאיר - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, המכון
לטכנולוגיה ואחסון של תוצרת חקלאית, מנהל המחקר החקלאי, ת.ד. 6, בית דגן 50-250

Nativ Dudai, and Eli Ptievsky,

Unit of Aromatic Plants, ARO, Newe Ya'ar, POB 1021 Ramat Yisay 30095 ISRAEL
E-Mail: dudai_n@netvision.net.il

Gabi Zubery - Yair Exp. Station, Arava vally

E-Mail: gabi@arava.co.il

Ziva Gilad - Zvi Exp. Station, Gordan vally

E-Mail: r-d@internet-zahav.net

Moshe Yosef - Minisrty of Agriculture Extension service Beer Sheva

E-Mail: myosef@shaham.moag.gov

Sonia Philosoph-Hadas and Shimon Meir

Department of Post Harvest Science of Fresh Produce, Institute for Technology and
Storage of Agricultural Products, ARO, POB 6 Bet Dagan 50-250 ISRAEL

האם הינך מאשר את ציון הפסקה הבאה בדף הפתיחה לדו"ח **כן/לא** מחק את המיותר
המצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים ואיןם המלצות לחקלאים

• חתימת החוקר

תקציר

מטרת התכנית היא לאתר ולבוחן פוטנציאל של צמחי תבלין לשימוש כגידול לפרחי קטיף. בונה יער קיים אוסף גדול של צמחי תבלין. הטיפוסים אשר בידינו אמורים מותאמים לגידול בתנאי הארץ, אך הם לא נבדקו עדין במסגרת מוייף כגידול לפרחי קטיף. במסגרת העבודה נבחנת האפשרות לפתח טיפוסים המתאימים לשימוש כפרחי קטיף ריחניים. בשנה הראשונה הושארו כל המינים באוסף בונה יער לפריחה (עד עתה נהוג לקצרם לצמחי תבלין). במקבב שנערך בשיתוף עם אנשי מקצוע בענף הפרחים נבחרו המינים העיקריים להמשך העבודה: זני בזיל (*Ocimum basilicum*), מיני אורגנו (*Origanum* sp.), מרווה (*Salvia* sp.), אכילהה (*Achillea* sp.), רוזמרין (*Rosmarinus officinalis*), קאת נאכלת (*Catha edulis*), ווטיבר (*Vetiveria zizanioides*). בשנה השנייה נבחנו המינים העיקריים שנבחרו לאחר תצפית השנה הראשונה להמשך העבודה: זני בזיל (*Rosmarinus officinalis*), מרווה (*Salvia* sp.), אכילהה (*Achillea* sp.), רוזמרין (*Ocimum basilicum*), קאת נאכלת (*Catha edulis*), ווטיבר (*Vetiveria zizanioides*). נערך ריבוי ואיתור הדרישות הפיזיולוגיות לפריחה של המינים הנבחנים. בניסויים בפייטוטרון נבחנו הדרישות לפריחה של ששת המינים ותוגבטים לאורך יום בטמפרטורות השונות. במקביל נערך ריבוי של המינים והטיפוסים הנבחנים. בשנה השנייה והשלישית נשתלו חלקות ניסוי של כמה מהם לתצפית ראשונית במוייף דרום. המינים שהועברו למוייף דרום נשתלו בחממות תצפית כגידול חד שניתי כנהוג בענף הפרחים. לפי התוצאות, התבליינים שנבחנו אינם מתאימים לגידול בשיטות אלה ויש לבחון את גידולם בשיטה פתוחה או תחת רשת ברד. בשנה השלישית בוצעו גם בדיקות חי האגרטול של המינים הנבחנים.

מבוא ותיאור הבעה:

ענף הפרחים הוא ענף דינמי ומתפתח שהיקפי הייצור שלו עלים מדי שנה, וכך להתרות בשוקים יש הכרח בהחדרת מוצרים מעוניינים וגידולים חדשים בתדרות גבוהה. צמחי תבלין ובושם פרוחים, בעלי הניחוח האופייני לכל מין, עשויים لكن להיות מוצר חדש וייחודי בסל פרחי הקטיף המיצאים מישראל, שייהי בעל פוטנציאלי יצוא גבוה בשל הדרישת הגברת והולכת ליותר נוי ריחניים. בצמחי התבליין הפורחים מתווסף לניחוח המוכר של העלווה גם ריח הפרחים, הנובע מעליית תכולת השמן האטררי שביהם ומהמשמש להגנת ייחדות התפוצה.

בנוסף לער קיים אוסף גדול של צמחי תבלין. בעבודה הקדמית נמצא ובודדו טיפוסים המתאימים לשימוש כפרחי קטיף ריחניים. המינים העיקריים כוללים: זני בזיל (*Ocimum basilicum* מיוני אורגנו (*Origanum* sp.), מרווה (*Salvia* sp.), לענה (*Artemisia* sp.), אכילה (*Achillea* sp.) ולבנדר (*Lavandula* sp.). הטיפוסים אשר בידינו אמינים מותאמים לגידול בתנאי הארץ, אך הם לא נבדקו עדין במסגרת מושג'ה כגידול לפרחקי קטיף. על פי התרשומות אנשי המקצוע בענף הפרחים, הטיפוסים של מיני התבליין אשר בידינו נראים מבטיחים למטרה זו.

לדוגמא: זני בזיל בעלי פריחה קומפקטיבית בצע ארגמן שאינה נושרת באחסון. זני מרווה מיוחדים בעלי פריחה כדורית (לא שיבולת כרגיל) או פריחת ענק סגולה בעלי גביע בצע ארגמן, לבנדר עם עלה שפה סגולים וכן אכילה בעלת תפוחות דקורטיביות צהובות צפופות מאוד (לא דומה לאכילה הקיימת בענף הפרחים).

יש לבחון את אפשרות הגידול והפריחה של מיני התבליין השונים במיפוי האזוריים, כדי להפכים לגידול רוחני מבחינה חקלאית. בנוסף, יש להבטיח את איכות המוצר הקטוף מבחינת חי אגרטל, שכן ענפי הפריחה של מיני תבלין אלה סובלים מבעיות שונות כמו: העדר פתיחת פרחים, נשירת עלווה והשחרת והרגשות לצינה, וכן חובלתם בתנאים בלתי מתאימים עלולה לגרום נזקם בעקבות היבול. משLOW מוצרים חדשים ללא ניסיונות ובדיקה יסודית בשלב מוקדם - עלולה לגרום במוניטין ובפוטנציאלי הייצור שלהם.

מטרת המחקר העיקרית היא בחינת פוטנציאל הגידול והי אגרטל של פרחי התבליין שאוטרו לבחינה במשק מודל ושל זנים נוספים גדלים בחוות בנואה יער ואשר עדין לא נבחנו. לשם כך נבחנו המטרות הספציפיות הבאות: א. בחינת הדרישות הפיזיולוגיות של צמחי התבליין כדי לקבל פריחה בעונת החורף; ב. בחינת גידול צמחי התבליין במיפוי האזוריים השונים, ג. פיתוח טיפולים להארצת חי האגרטל ולהפחיתה הנשירה וחומרת נזקי הצינה במהלך המשלחת.

פרוט הניסויים שבוצעו והתוצאות שהתקבלו לתקופת הדוח:

בונה הראונה התרכנו באיתור המינים והטיפוסים העיקריים שנראים בעלי פוטנציאל לשימוש כפרחי קטיף ויישמו להמשך העבודה ובריבוי של המינים המבטיחים. בחלקים התגלו בשלב ריבובי מאחר שאינם מינים ידועים ומקובלים בגידול תרבותי (מקורים באוכלוסיות בר או אינטראודקציה).

מהמין נערך במספר רבם ריבובי בהצלחה נשתלו בנואה יער חקלות צפויות בשטח פתוח וbove רשת, המשמשים ל刻苦 וכמצחאים לריבובי. בניסוי בפייטו-טורון נבחנת תגובת הצמחים לאורן יום וטמפרטורה, בעיקר להבנת הדרישות לפריחה. הניסוי הועמד בפייטו-טורון מנהל המחקר התקלאי ונמשך השנה השנייה עד סוף נובמבר, כשהוחלפו והוספו תוך כדי הניסויים מינים לבחינה בהתאם

למועד הפריחה. הצמחים גודלו בעציים בנפח 1 ליטר בתערובת גידול כבול וטוף 1:1. ההשकיה בתמיסת דשן בוצעה מדי יום כנהוג בפייטוטרון.

להלן המינים העיקריים שנבחרו להמשך העבודה ותוצאות הבחינה בפייטוטרון לגבי כל אחד מהם:

בזיל מתוק (*Ocimum basilicum*). נבררו 2 טיפוסים בעלי פריחה קומפקטיבית, שעלי החפה שליהם ארוגמניים. זו אחד הוגש לרשום במועצה לצ奇ות מטעחים בשם "קרדינל". שני הטיפוסים הוצבו בפייטוטרון והראו צמיחה מהירה בקורסיה עם טמפרטורת הסביבה. כך גם לגבי מועד הפריחה. בטמפרטורות הגבוהות הצמח התנתק באופן דומה לזה שבחמה – עלים גדולים וצמחים רבועים. בנוסף, הייתה נגיעה לבסיסם. הצמיחה לגובה בכל הטיפוסים לוותה בתוספת הפרקים והתארכיותם, והייתה נרצת יותר ככל שעלה הטמפרטורה. כך גם לגבי שטח העלים (איור 1). גם מועד הפריחה היה מוקדם יותר ככל שעלה הטמפרטורה, 12-15 שבועות בטמפרטורות הגבוהות ו- 16 שבועות ומעלה בטמפרטורת גידול של 20/20 מ'ץ (לילה/יום). בטמפרטורה נמוכה יותר הצמח לא הגיע לפריחה כלל במשך תקופה הניסוי (איור 1). יש לציין, שבתנאי החמה בפייטוטרון מבנה הפריחה היה מפוזר והצבע בהיר יותר ביחס לזה המתקבל בשטח פתוח.



בחינה במ"פ דרום:

במסגרת התצפית נשתלו במ"פ דרום ב- 00/9/29 שתילי bazil קרדינל בבית רשות ים טבי, בית רשות ים אrox, חמורה ים אrox לא חיים וחמורה ים אrox עם חיים. כחודש מאוחר יותר נשתלו שתילים נוספים בחמת ים אrox עם ולא חיים. הצמחים נשתלו בעומק 20 למ"ר וכחודש לאחר השטילה עברו קיטום. תנאי היום האrox ניתנו כשבירתليل בהארה מחזרית (15/5) למשך 6 שעות (00:00-21). לתאורה שימושו נורות להט 150 וואט. התאורה פעלה מהشتילה ועד סיום הגידול. החמה עם החימום, חומרה במהלך הלילה ל- 18 מ'ץ והחימום בה הופעל ממצע נובמבר עד אמצע אפריל.

הבזיל קרדינל בעל חפים במבנה וצבע מרושיםים, אולם בעל עליים גדולים יחסית שהתחפחו בתנאי הגידול שנבחרנו אשר פוגמים במרקם המוצר בגלל פרופורציה לא מתאימה בין העלים לתרף.

יתכן וגידול עם פחות מים ודרש עשוי לשפר את מראה המוצר. מהتوزצות במ"פ דרום ובפייטוטרון עולה שהטיפוסים שנבחרנו אינם מותאים לגידול בחמה. הם גם רגשים לפזרויום. לאחר שבני הבזיל הקוליני הצלחנו להקנות עמידות לפזרויום, יש להזכיר מאמצ' בכיוון זה גם בזנים האלה. בנוסף, מבין שני הטיפוסים לאחד יש הופעה מתאימה יותר מבחינת מבנה העלים אך הוא אינו נקי גנטית – מתבלט שוניות בצבע הפרחים. בגידול שערכו בנווה יער בשנה השלישית של המחקר בשטח פתוח הצמחים פרחו 10 חודשים בשנה ואף שרדו את החורף. נראה שטיפוסי הבזיל האלה ראויים להבחן בשטח חצי מסחרי לייצור ענפי פריחה בגידול בשטח פתוח או תחת רשות ברד.

איור 1 : פריחה וצמיחת בזיל מין "קרידינל" בהשפעת משטריו אורך יום וטמפרטורה בפייטוטרון. במקרה מצויננת טמפרטורת היום. טמפרטורת הלילה הייתה בכל מקרה נמוכה ב- 8 מ'ץ מטמפרטורת היום. יום קצר – 10 שעות يوم טבעי, יום ארוך – 20 שעות : 10 יום טבעי ועד 10 תארה מלאכוטית.



תמונה 1 : בזיל קרידינל 7 ימים באגרטל.



מבחני חי אגרטל :

קטיף : 18.11.02 הענפים נקטפו בשעות הבוקר מתחנת ניסיונות בנוה יער, והובאו לוולקני במים. מחצית מכל גידול הוצאה ישירות בתצפית ב- 18.11.02 ב- TOG-6 ומחצית השנייה הועברה לסימולציה שלוח אווורי (18-20.11.02) יומיים ב- 6 מ'ץ, והוצאה בתצפית ב- 20.11.02 ב- TOG-6. תוצאות : קיימת בעיה של חוסר טרגור בעליים, עם סימנים של השחרות והצחבות בעליים. לאחר 6 ימים באגרטל היה נשירת עליים

תחתוניים. בענפים שעברו סימולציה שלוח אוויריה היו נזקים חמורים יותר, שהתבטאו בנשירת ובהחרות עלים. לתפרחות לא נגרם נזק.

מועד קטיף : פרחי התבליין נקטפו ב- 10.7.03 בשעות הבוקר והובאו לוולקני במים הצבה באגרטל: ב- 10.7.03 ב- TOG-6. בזיל קרדינל, לא הובנה כל בעיה, העלים היו יפים ללא סימני הצהבה ולא הייתה נשירת עליים (תמונה 1)..
בחינת הופעת נזקי צינה בענפי בזיל לאחר סימולציה של שלוח אוויריה בטמפרטורות אחסון שונות, קטיף 17.9.03 : מקור הפרחים בתחנת ניסיונות נווה יער. 100 ענפים נקטפו ישירות ממים והובאו לוולקני במים. סימולציה שלוח אוויריה: (17-19.9.03) יומיים בטמפ' אחסון שונות הוצאה לאגרטל: 19.9.03 ב- TOG-6


מספר טיפול	סוג הטיפול
1	ביקורת 20°C, ללא סימולציה שלוח - תצפית
2	סימולציה שלוח בקרטון 20°C
3	סימולציה שלוח בקרטון 12°C
4	סימולציה שלוח בקרטון 6°C
5	סימולציה שלוח בקרטון 2°C

תוצאות:

טיפולים		מראה כללית (0-4)	הזהבת עליים (1-4)	טיפולים
יום 4 באגרטל				
1. ביקורת 20°C, ללא סימולציה שלוח	0.1 b	1.0 b		
2. סימולציה שלוח בקרטון 20°C	1.3 a	2.1 a		
3. סימולציה שלוח בקרטון 12°C	0.6 b	1.1 b		
4. סימולציה שלוח בקרטון 6°C	1.8 a	1.9 a		
5. סימולציה שלוח בקרטון 2°C	2.0 a	1.9 a		


בהתוצאה מסימולציה שלוח אוויריה בענפים שאוחסנו בטמפרטורות 2 ו- 6 מ"ץ הופיעו נזקי צינה, בענפים שאוחסנו בטמפרטורה 20 מ"ץ העלווה נראית כמושה, ונראה שהם איבדו מים. בצמחים שלא אוחסנו (צמחי ביקורת) לא נראה נזקים. הטמפ' האופטימלית בסימולציה שלוח הייתה 12 מ"ץ.

תמונה 2: השפעת טמפרטורה משתנה על מופע עלי בזיל לאחר 3 ימים באגרטל



אכילהה (Achillea) טיפוס האכללה הנבחן בורר מתוך חומר ריבוי שנאסף על ידיינו באוכולוסיות בר בטורקיה. הוא בעל הופעה מעניינת ועשוי להיות מתאים לשימוש אורנמנטלי. התפרחות צהובות, נישאות על עמוד הפריחה בגובה 40-60 ס"מ. הצמח דומה לאכילהה "פרק" המשווקת כיום אך התפרחות צפופות יותר, מסודרות מבניה איי רגולרי, ובשלבים מתקדמים יותר מתבלת מעין צורת אלמוג. העלים משוניים מאוד, בדומה לאכילהה "אלף העלים" המקבלת צמח מרפא. קיימים שני טיפוסים, אחד קומפקטי ונראה מתאים לעציים והשני בעל ענפים גבוהים יותר ונראה מתאים כפרח קטיף. בתצפית חובבנית באגרטל בנווה יער ללא כל טיפול חי האגרטל שלו היו ארוכים במיוחד. הבעה העיקרית שנטקלנו בה היא הריבוי. למרות כל ניסיונותינו, פיצול צמחים או השrustם התקבלו תוצאות מאכזבות. גם הצבת השטילים שנקלטו בפייטוטרון הניבה תמורה רבה במהלך הניסוי. מאוחר שմדובר בטיפוס אינטראודקציה מהבר נראשה המשך ריבוי הצעדים שרדיו עשוי להניבZN פורה יותר. בנוסף, יש לבחון שיטות ריבוי הנוהגות באכילותאות אחרות, כגון טיפול ורנלייזציה. הריבוי בתקופת החורף יהיה מוצלח יותר, וממנו הועברו שטילים למוייפ' דרום ומוייפ' גלגל. מהותאות בפייטוטרון עולה (אייר 2): 1. הצמחים פורחים רק ביום ארוך. הצמחים מתפצלים ומנבגים תפוחות רבות הנישאות על ענף של כ- 50 ס"מ. 2. מבחינת כמות הפרחים לצמח משטר הטמפרטורה האידיאלי יהיה 15/15 מ'ץ (לילה/יום). 3. יש יתרון לטמפרטורות הגבוהות מבחינת צפיפות הפרחים, המKENה להם את המראה הנאה המיכון לטיפוס זהה. לעומת זאת, קוטר התפרחות עולה בטמפרטורות הנמוכות. מהתצפית הראשונית ולאור תגובת הצמח לתנאי הסביבה נראה שהזיהו טיפול מעוניין לגידול תוך הכוונת הפריחה וההופעה, בעיקר על ידי בקרת טמפרטורה ואורך יום בחורף.

איור 2: התפתחות פריחת האכלאה במשתרי טמפרטורה בפייטוטרון. במקרה מצוינת טמפרטורת היום. טמפרטורת הלילה הייתה בכל מקרה נמוכה ב- 8 מ'ץ מטמפרטורת היום. יום קצר – 10 שעות يوم טבעי, יום ארוך – 20 שעות: 10 ימים טבעי ועד 10 תארוה מלאכותית.



בחינה במומ"פ דרום:

אכלאה מהזון אלמוג נשתלה בבית רשות ביום ארוך. תנאי היום הארוך ניתנו כשבירת לילה בהארה מחזורית (15/5) לפחות 6 שעות (00:30-00:21). לתארוה שימשו נורות להט 150 ווואט.

התארוה פעלת מהשתילה ועד סיום הגידול. האכלאה אלמוג בעלת תפරחת בנייה היבט ובעלת צבע צהוב יפה, אולם יכול פרחים נמוֹעַ וענפי פריחה קצרים מדי (40-50 ס"מ). היא התחלתה לפירות רק בתחילת מרץ חצי שנה לאחר השთילה. כדי לבדוק את גידולה במועד שתייה שונים בבית רשות ובחמהה וכן לבחון טיפול גיברליין שונים ע"מ לקבל מוצר הרاءו לשיווק.

בחינת חי אגרטל: מועד קטיף: פרחי התבליין נקטפו ב- 10.7.03 בשעות הבוקר והובאו לוולקני במים הצבה באגרטל: ב- 10.7.03 ב-6 TOG. לאחר 5 ימים באגרטל בפרח האכלאה, הייתה הגברת של החמת תפוחות, וכמו כן גם הצהבות והחומות עלים (תמונה 3).

תמונה 3: אכלאה "אלמוג" יום 7 באגרטל



מרווה רפואי (*Salvia officinalis*). טיפוסי המרווה שנבחנו נבחרו מתוך מגוון טיפוסים שבודדו לאחרונה במסגרת הסלקציה מתוך אוסף גדול מאוד של מרוות שנאספו באוכלוסיות ברבעולם. גידולים בכפיפה אחת בנווה יער מאפשר הצלאות ספונטניות מעניינות בין פנותיפים מאזורים שונים בעולם, בשל הריחוק הגיאוגרפי אין מתרחשויות בטבע. השارة הצמחים לפריחה לצורך המעקב גורם להצלאות כאלה מהן ניתן לאתר טיפוסים מיוחדים מעניינים. מהם

כאליה שם בעלי פריחה דקורטיבית במירוח (פרחים גדולים ו/או בעלי צבע מעניין ו/על גבעי מירוחדים). בנוסף, נמצאו טיפוסים בעלי ענף דקורטיבי גם כשיינים פרוחים. כל אלה מקורים בצמחים ייחודיים וערכנו להם ריבוי וגטובי לייצור צמחי אם להמשך העבודה. טיפוסים מייצגים הוצבו במסגרת התצפית בפייטוטרון. התוצאות מענייניות ביותר: מתוך 5 טיפוסים שנבחנו, 1 פרח בכל משתרי אורך היום, 1 פרח רק במשטר יום קצר בטמפרטורות נמוכות (כ-1) והיתר פרחו במשטר יום ארוך. ניתן שההכלאות שהתקבלו באוסף היו בין מיניות, כך שהכלואו מינימום בעלי דרישות פריחה שונות. מחמת קוצר הירעה, לצורך הצגת התוצאות ישמשו רק הקלונים "כ-1" ו"כ-4" כמייצגים (איור 3). הקלון כ-1: הצמחים במשטר הימים הארוך בכל הטמפרטורות התארכו מאד ולא פרחו. לעומת זאת, הצמחים ביום הקצר נשארו קומפקטיים, בעלי פרקים קצריים אך במספר דומה לאלה שבצמחים הימים הארוך, והתקבל צמח עציץ נאה. בטמפרטורות הנמוכות (9/17 ו-12/20 מ"ץ לילה/יום) הופעה פריחה אחרי 60-70 ימים. בטמפרטורות הגבוהות יותר לא התקבלה פריחה. לפי התוצאות מדויבר בצמח יום קצר עם דרישת תקופת קור לפריחה. יש לבדוק השפעת טיפולים מקדימים לבקרת הפריחה. העלים בטיפולי הימים הארוך היו גדולים יותר בהשוואה לצמחים בטיפולי הימים הקצר. הייתה מגמה של ירידיה בגודל העלה עם העלייה בטמפרטורה. הקלון כ-4: הפריחה החלה להופיע לאחר שבועיים רק בטיפולי הימים הארוך. בטמפרטורות הגבוהות (18/26 מ"ץ ומעלה) היו פרחים בודדים ולא מפותחים. בטמפרטורות הנמוכות יותר (15/23 ומעלה) הייתה התפתחות תקינה ותוספת ענפי פריחה עד כ-10-20 תפוחות לצמח (איור 3). יש לציין שב深交 המרווה פורחות בתקופה קצרה באביב (אפריל-מאי).

תצלויות במו"פ דרום:


מרווה מהזון 1/24 נשטלה ב- 2/9/02 בבית רשות ים טבאי, בית רשות ים ארוך ובשטח פתוח. צמחים עברו קיטום בחודש וחצי לאחר השטילת. בתיה הרשת מוחופים עם רשת ברד% 18% צל. תנאי ים ארוך ניתנו כסבירת לילה בהארה מחוזרית (5/15 למשך 6 שעות 21:00-3:00). לתאורה שימושו נורות להט 150 וואט. התאורה פועלה מהשטיילה ועד סיום הגידול.

המרווה פרחה רק בתנאי ים טבאי ומאוחר יחסית, רק בתחילת אפריל והייתה בעלת פרחים יפים בצבע ורוד וגביעלי פריחה ארוכים יחסית כ- 80 ס"מ במעט,อลום גם בסקרה זה העלים גדולים מדי בהשוואה לתפרחת. ניתן שגם במקרה זה מצויים בכמות הימים והדשן תשפר את מראה המוצר. יש לבצע זנים נוספים מקדימי פריחה, ולהילופין לבצע גידול ענפים לא פורחים ענפי קטיף.

מבחני חי אגרטיל: מועד קטיף : ענפי התבליין נקטפו ב- 10.7.03 בשעות הבוקר והובאו לוולקני במים הצבה באגרטיל : ב- 10.7.03 ב- TOG-6 במרווה רפואי "כללית 1", הענפים נראו יפה, עם מעט מאוד הצהבות עלים תחתוניים. תופעה זו לא הוגברה בהמשך (תמונה 4).

קטיף 24.7.03 : ענפים פורחים של התבליין נקטפו בשעות הבוקר והובאו לוולקני במים, רפואי התבליין נארזו ישירות בקרטון לסימולציה של משלוח אוורי סימולציה של משלוח אוורי: (24-27.7.03) 3 ימים ב- 6 מ"ץ הצבה באגרטיל : 27.7.03 ב- 6 TOG-TOG בהתוצאה של פרחי התבליין מסימולציה של משלוח אוורי, בצמחים המרווה הופיעו השחרות רבות בעלווה ונשירה של פרחים. לאחר 3 ימים באגרטיל נראו הצהבות והשחרות רבות יותר בעליווה, התפרחת החלה להזדקן והוגברה נשירת הפרחים.

איור 3: פריחה ומורפולוגיה של מרווה רפואי בפייטווטרונו בזנים C-1 ו-C-4. במקרה מצוינית טמפרטורת הים. טמפרטורת הלילה היתה בכל מקרה נמוכה ב- 8 מעלות מטמפרטורת הים. יום קצר – 10 שעות יום טבעי, יום ארוך – 20 שעות: 10 יום טבעי ועד 10 תארה מלאכותית.



תמונה 4: פָּרָוָה כְּלִילָה יֹם 7 בַּאֲגָרֶטֶל




תמונה 5: רָאוּמָן יֹם 7 בַּאֲגָרֶטֶל



רוזמרין (*Rosmarinus officinalis*) רוזמרין מהזון "ברביקיו" שטופח בנווה יער משוק באופן ניסיוני על ידי משק מיפוי כענף ירוק. הוא מתאים לשמש כענף קטיף חן בשל צורתו הדקורטיבית והן בשל אופי צמיחתו – ענפים זkopים ללא התפצלויות. בנוסף, אוטרו באוסף הזנים טיפוסים שנראים בעלי ייחוד וראויים לבחינה. נערך ריבוי של זן אחד שנבחר ("טיפוס מס' 8") והשתילים נשלו בנווה יער בחלוקת תצפית בשטח פתוח ובבית הרשות. בנוסף, הוכנה חלקת צמחי אס חממה לצורך המשך הריבוי. לזרן זה מופיע עליים ייחודי וaterno. במקביל הוכנסו צמחי רוזמרין "ברביקיו" לפיטוטרונו. בצמיחה לגובה היה יתרון ברור למשטר היום הארוך ולעליה ברמת הטמפרטורה (איור 4). אין לנו הסבר לעיכוב בצמיחה הטיפול 12/20 במשטר היום הארוך. הענפים הגיעו לגובה 50-60 ס"מ לאחר 18 שבועות בטמפרטורות הגבוהות (26-29 מ'צ') במשטר היום הארוך ולאחר 25-33 שבועות במשטר היום הקצר. פריחה הופעה לאחר 33 שבועות רק בענפי היום הארוך. מאחר שלפי הערכנתנו המוצר יהיה ענפים שאינם פורחים, נראה שכדי לקבל ענפי קטיף בחורף יש לתכנן זאת כך שייצמחו בקייז ובסתיו כך שיהיה מוכנים לקציר במועד הרצוי. לפיכך, יש לבחון גיזום בתנאי שדה אמיתיים במועדים שונים בקייז. יש להסתיג, שכן נבדק רק זן אחד, שכבר נמצא בשלבי גידול במשק מיפוי (במושב אמצ'). זנים אחרים עשויים לצמוח בקצב שונה.


איור 4 : התפתחות ופריחה ברוזמרין "ברביביקו" בפייטוטרון. במקרה מצוינת טמפרטורת היום, טמפרטורת הלילה הייתה בכל מקרה נמוכה ב- 8 מ' צ מטמפרטורת היום. יום קצר – 10 שעות ים טבעי, יום ארוך – 20 שעות : 10 ים טבעי ועד 10 תאורה מלאכותית.



תצפית במו"פ דרום: צמחי הרוזמרין נשתלו בספטמבר 2002 בבית רשות ים ארוך ובשטח פתוח הרוזמרין פרח לקרהת סוף מרץ - 6 חודשים לאחר השטילה. ענפי הפריחה היו באורך של כ- 50-60 ס"מ. הzon 8 הוא בעל מופע זקור ומיוחד, נראה מתאים בענף קטיף. מבחני חyi אגרטל: הענפים נקטפו בשעות הבוקר מתחנת ניסיונות בנוה עיר, והובאו לוולקני במים. מחצית מכל גידול הוצאה ישירות בתצפית ב- 18.11.02 ב- TOG-6 ומחצית השנייה הועברה לשיטים. מחצית משלוח אוויר (18.11.02-20.11.02) יומיים ב- 6 מ"צ, והוצאה בתצפית ב- 20.11.02 ב- TOG-6. תוצאות: ענפים יפים וירוקים, לא נראה סימנים של הצהבת עלים במהלך חyi אגרטל, לא נראה בעיות גם בענפים שעברו סימולציה משלוח אוויר. מועד קטיף: פריחת התבליין נקטפו ב- 10.7.03 בשעות הבוקר והובאו לוולקני במים הצבה באגרטל: ב- 10.7.03 ב- TOG-6 ב- 10.7.03 בראזמרין, ענף התבליין יפה, לא הובנה כל בעיה, והעלים היו ללא סימני הצהבה ולא נשירה (תמונה 5).

וטיבר (*Vetiveria zizanoides*) זה מין משפחת הדגניים שמשמש להפקת שמן אתריא מון השרשים, בעיקר בהודו. הטיפוס שבידנו הגיע לארכ' לפני כ- 16 שנה מהאי ראוניון. בנוסף, לאחרונה הובא טיפוס אחר מהודו. הצמחים פורחים בתפרחת ארגמנית החל מן הסתיו ועד האביב. זאת בתנאי גידול בשטח פתוח ללא טיפול מיוחד. בנוסף, הענפים הירוקים בעלי עלים סרגליים זקופים וקשייחים נראים גם הם מותאיימים לשיווק. בבחינה של גידול הוטיבר בפייטוטרון, נמצא,ऋפי, שהצמחה נمرצת ככל שעולה הטמפרטורה (אייר 5), גם לגובה וגם לרוחב (מתבטה במספר החותלות לצמח). לא נמצאה השפעה לאורך היום. הצמחים בפייטוטרון לא פרחו, אפילו לאחר שנה שלמה. זאת לעומת צמחים בשטחי הניסיונות בנוה עיר שפורחים בסתיו אפרילו 3-4 חודשים אחרי השטילה. ניתן שהדבר תלוי בנצח בית השורשים. צמחי הוטיבר בפייטוטרון היו במיכלים בנפח 2 ליטר. לפי התוצאות, להשגת יבול ענפי קטיף בחורף יש לגדל את הצמחים במשך הקיץ המאוחר. מכיוון שהוא שיח רב שנתי בעל דרישות השקיה והוצאות גידול מינימליות, אין בכך בעיה. יש לעורך ניסויים לאופטימיזציה של מועד וגובה הקציר, השקיה, הזרנה וכדי להשגת תוצאה אופטימלית בחורף.

איור 5 : התפתחות ופריחה בוטיבר בפייטוטרון. במקרה מצוינת טמפרטורת היום. טמפרטורת הלילה היתה בכל מקרה נמוכה ב- 8 מ'ץ מטמפרטורת היום. יום קצר – 10 שעות يوم טבעי, יום ארוך – 20 שעות: 10 يوم טבעי ועד 10 תוארה מלאכותית.



תיפוי גידול בנוה יער: כדי לבדוק את פוטנציאל הצמח כמקור לפחבי ו/או ענפי קטיף ביקשנו בינואר 2001 מגדל (מייקי אבידור מרם און) לשולחן שלוחוי ניסיוני לחוויל. נקטפו בשטח פתוח ענפים ותפרחות של צמחים שנשתלו 15/4/2000. היבול המוחשב של ענפים ופרחים ארוזים היה בשיעור של כ- 215000 לדונם (נקטפו כ- 10 מ'יר בשני מועדים). במשלוח ניסיוני הענפים והפרחים נמכרו בבורסה, אם כי במחיר נמוך יחסית – כ- 8 סנט יורו. בהתחשב שמדובר בגידול בגלגול בלבד בחזאות וביבול ענפים/פרחים עצום במשך חמשה חודשים החורף, המשכנו לבדוק את הגידול בקנה מידה נרחב יותר. בפברואר 2002 נשלחו שוב משלוחים בהצלחה, והוקם שטח מודל של כ- 1 דונם במשק המגדל. בנוסף, ענפים מחלקות הניסיונות בנוה יער שמשו לשלוחה תצוגה של מינים חדשים בבורסה בהולנד. יש לציין שבנוה יער החלקה שנבחנה היא רב שנתית בשטח פתוח וחציה מגודל בהצלחה

בתנאי בעל, כך שהוצאות הגידול הן אפסיות. בתאריך 1 בפברואר 2002 נקבעו שיחים כמייל שגודלו עם או בלי השקיה. התוצאות (ממוצע למייר) :

הטיפול סה"כ	ענפים ללא פריחה	ענפי פריחה	ירוקים החקiya
239	190	49	בלי השקיה (גידול בעל)
212	75	137	

לפייך עולה מן התוצאות שניתנו גדל את הוטיבר לענפים פורחיםם ללא השקיה, אך לקטיף לענפים ירוקים ההחקייה הכרחית. הקטיף, האריזה והמשלוח נערך בעזרת המגדל מיקי אביזור מס און. הענפים שנקטפו מוגנו לאורך 90 ס"מ (נקטו בקצתה העליון לפי הצורך) ונארזו למשלוח ניסיון. באריזה אגדים של 25 ענפים כ"א ליצוא נכנסו בקרטון "מס 3" 20 אגדים (500 ענפים). משקל ממוצע לענף היה 24 גרם), סך כל משקל הקרטון 12 ק"ג. לאחר כמה משלוחי ניסיון שבוצעו על ידו השתל המגדל שטח מסחרי של 2 דונם בשיטה פתוחה להמשך החדרת הגידול לשוקרים.

מבחון חי אגרטל

קטיף 18.11.02 : הענפים נקטפו בשעות הבוקר מתחנת ניסיונות בנוה יער, והובאו לוולקני במים. מחצית מכל גידול הוצאה ישירות בתצפית ב- 18.11.02 ב- 6 TOG ומחצית השנייה הועברה לסימולציה משלוח אווורי (18-12.11.02) יומיים ב- 6 מ"ץ,

והוצאה בתצפית ב- 20.11.02 ב- 6 TOG. תוצאות : קיימת בעיה של הצהבות ענפים, לאחר 6 ימים בחווי אגרטל נראו ענפים רבים שהצהיבו, מראה דומה היה גם לענפים שעברו סימולציה משלוח אווורי.

קטיף 24.7.03 : פרחי התבליין נקטפו בשעות הבוקר והובאו לוולקני במים, פרחי התבליין נארזו ישירות בקרטון (24- 27.7.03 3 ימים ב- 6 מ"ץ הוצאה באגרטל : 27.7.03 ב-

6 TOG בענפי וטיבר נראו הצהבות עלים בהוצאה מסימולציה משלוח אווורי, ותופעה זו התגברה במהלך חיו אגרטל.

מטרת הניסוי : בוחנת השפעת טיפול הטענה שונים למניעת הצהבות עלים בווטיבר

קטיף 25.11.03 : 170 ענפים מקור הצמחים : תחנת ניסיונות נווה יער. הענפים הובאו למרכז וולקני במים, ונראו במצב שיש תחילת הצהבות בעליים. טיפול הטענה :



26.11.03 הוצאה לחדר תצפית : 4 שעות ב- 20 מ"ץ + 20 שעות ב- 20 מ"ץ. הוצאה לחדר תצפית : 3 TOG-6

מספר טיפול	סוג הטיפול
1	ביקורת- TOG-6
2	גיברLIN (GA3) 100 ppm
3	ציטוקinin (BA) 0.5%
4	0.3% STS
5	0.5% NAA
6	פרומLIN (GA4+7 + BA) 10 ppm
7	פרומLIN 100 ppm
8	(GA4+7) 10 ppm Provide
9	100 ppm Provide
10	(Thidiazuron) 50 μ M TDZ
11	100 μ M TDZ

בדיקות בחרט לצפית: דרגת הצהבות עליים 25.11.03

תוצאות

הצהבות עליים (0-5)		טיפולים
יום 12	יום 7	
2.7 c	1.1 bcd	1. ביקורת- TOG-6
5.0 a	2.1 ab	2. גיברLIN 100 ppm
1.8 d	0.3 d	3. ציטוקinin (BA) 0.5%
2.8 bcd	0.9 cd	0.3% STS .4
3.8 abc	3.2 a	0.5% NAA .5
2.9 bcd	1.4 bcd	6. פרומLIN 10 ppm
2.5 d	0.9 cd	7. פרומLIN 100 ppm
3.7 bc	3.1 a	.8 10 ppm Provide
4.0 ab	3.0 a	.9 100 ppm Provide
2.0 d	1.0 bcd	.10 50 μ M TDZ
2.2 d	1.5 bc	.11 100 μ M TDZ

הזהבה נמדדה לפי סולם דרגות (0-5) : 0 = אין הזהבה ; 5 = הזהבה חמורה בכל הענף
מועד קטיף וכמותו : 150 ענפים נקטפו ב- 22.3.04 למים באיכות לא טובה (התיבשיות והזהבות
בעליים), מקור הפרחים : תחנת נסיעות נווה יער.

נעשה מיון והענפים קוצצו לאורך של 60 ס"מ והוכנסו לתמיסות החטעה.
מטרת הניסוי: בבחינת השפעת טיפולים למניעת הצהבות עלים בענפי וטיבר קטופים
טיפול הטענה: (23-24.3.04) 4 שעות ב- 2 מ"צ + 20 שעות ב- 2 מ"צ. הצבה באגרטל :
ב- TOG-6

מספר טיפול	סוג הטיפול
1	ביקורת – TOG-6
2	גיברLIN ppm 50
3	גיברLIN ppm 100
4	גיברLIN ppm 150
5	0.5% BA
6	0.5% BA + 50 ppm
7	0.5% BA + 100 ppm
8	0.5% BA + 150 ppm
9	50 μM TDZ
10	100 μM TDZ

תוצאות

לאחר 3 ימים באגרטל נראה הצהבות חמורות בכל הענפים בכל הטיפולים. יש לציין שהענפים הגיעו במצב איקות לא טובה. כדי לחזורשוב על הניסוי באיכות ענפים טוביה יותר.


קאת נאכלת *Catha edulis*: לאחרונה התחלנו באיסוף טיפולים המין זהה, שגדל ונצרך בארץ על ידי יוצאי תימן. בעזרתו ריבוי מזרעים קיבלו טיפולים בעלי עלים בצע ארגמני כהה, המתגבר בחודשי החורף. הענפים אף הם בצע אדום בחלק מן הטיפולים, וב的日子里 הופעה דקורטיבית מרשימה. בבחינה ראשונית מצאנו שחמי האגרטל ללא כל טיפול הם ארוכים יחסית (לפחות שבועיים). יש לציין שבמדיניות מסוימות הצמח הזה אסור לשימוש. ככל הידוע לנו באירופה הוא מותר. צעד ראשון בוררו קלונים מבטחים – ירוקים וארגמנים, ונערך ריבוי וגטטיבי שלהם. 2 קלונים ממייצגים, ירוק וארגמני הוכנסו לבחינה בפיטוטרון. הצע הארגמני נחלש ככל שרמת הטמפרטורה עולה. תופעה זו בולטות גם בשטחי בנישונות – ממשן בסתיו עד החורף העלים והגביעולים מקבלים צבע כהה, שדוחה לאיתו מהרביב לקראות הקץ. בקלונים היירוקים אין שינוי צבע. לפי התוצאות, נדרשים 20-25 שבועות גידול בתנאי קיץ כדי להגיע לענפים בגובה של 50-60 ס"מ. צמיחתו של הzon ה"אדום" הייתה מהירה משל "HIROK". בטמפרטורת ממזגות מתקיים עליים גדולים יותר. כשהשארנו צמחים לאחר גמר הניסוי ב 2 רמות טמפרטורה, ניתן היה לבחין

בהתאם לצמיחה עד כדי 100-100 ס"מ במשטר היום הקצר. מענין, שרך אחרי 22 שבועות ניתן היה להבחין בהשפעת אורך היום על קצב הצמיחה (במשטר يوم קצר נמוך יותר). תיכון שהדבר נבע מכך שבאופן טבעי הגת פורחת בחורף. בנונה עיר, כאשר הצמחים נקצרו בסתיו, לא הייתה פריחה. לעומת זאת, השנה שלא גזמו את הצמחים, הופיע פריחה מלאה בדצמבר. תיכון, אם כן, שהאין דоказיה לפריחה נגרמת על ידי יום קצר וארוך מינימלי של הענפים.

תצפית גידול בנונה עיר: לאחר סלקציה של 172 טיפוסים שהתקבלו מרכיביו על ידי זרעים שנאספו מצמחי גת הנפוצה בארץ, בודדו 10 טיפוסים "ירוקים" ו"אדומים", נערך ריבוי וגטטיבי ונשתלו חלקות בגודל כ- 100 מ"ר כ"א. צפוי, הקלונים האדומים החיים ויפים המיוחדים בחורף ובאביב, ובהירים יותר בקייז. הענף נשאר בצלע ארגמני במשך כל השנה. ענפי הקטיף יפים מאוד ובאזור 40-60 ס"מ. לאחרונה התפרסם צמח הגת בכך שעקב מחסורים בעונת החורף והביבוש הרב על ידי יוצאי תימן, יש אישור ליבאו מأتיאופיה. דיוונים בעודות המתאימות בכנסת אישררו את חוקיותו, למרות שבמדיניות אחודות הוא נחשב "סת קל". משיחות עם יוצאי תימן, ייחודה של הגת האתיאופית הוא בכך שהיא אדומה. למוטר לצין שיש לנו קלונים של גת אדומה שמתפתחים גם בחורף טוב יותר בהשוואה לזרני הגת הרגילים. בקטיפי ניסיון עלה שניתן לקבל לפחות כ- 30 אלף ענפי קטיף לדונם.

מבחן חי אגרטל: קטיף: 18.11.02 הענפים נקטפו בשעות הבוקר מתחנת ניסיונות בנונה עיר, והובאו לוולקני במים. מחצית מכל גידול הוצאה ישירות בתצפית ב- 18.11.02 ב- TOG ומחצית השנייה הועברה לסימולציה שלוחה אוורירי (18-20.11.02) יומיים ב- 6 מ"ץ, והוצאה בתצפית ב- 20.11.02 ב- TOG. תוצאות: בענפים שלא אוחסנו לא נראה סימנים של הצהבות עלים או נזקים, העלים נראה ירוקים ויפים. אך לאחר שלוחה אוורירי של ענפי גת צדדיים הובחנו לאחר 7 ימים באגרטל הצהבות, כמישה ונשירת עלים תחתונים.

איור 6: התפתחות צמחייה בגיטויטרון. איור 3: פריחה ומורפולוגיה של מרווה רפואית בפייטוטרון בזנים C-1 ו-C-4). במקרה מצוינית טמפרטורת הים. טמפרטורת הלילה הינה בכל מקרה נמוכה ב- 8 מ' מטמפרטורת הים. יום קצר – 10 שעות ים טבעי, יום ארוך – 20 – 20 שעות; 10 ים טבעי ועד 10 תארה מלוכומת.



מסקנות והשלכותיהן על המשך ביצוע המחקר

במסגרת המחקר נבחנו באופן ראשוני כמה צמחי תבלין כפרחיה/ענפי קטיף. מקוצר היריעת, נבחנו מינים מותך האוסף בנווה עיר שנראו לנו יהודים ומבוטחים. מדובר בזנים מקוריים שהם פיתוח היחידה לצמחי תבלין ובושים. היתרונו בבחירה זנים אלה, מעבר לכך שהם יהודים, הוא בכך שנייתן לחזור אליהם במדוק, להבדיל מצמחי תבלין אחרים הקיימים בשוק שאינם אחידים ו/או לא תמיד ניתן להבטיח רציפות באופן הגנטי של חומר הריבוי.

רוב המינים שנבררו הם רב שנתיים ואינם מתאימים לגידול בחממה. בחלק מהם נתקלנו בבעיות בריבוי, שכן יש להשקיע מאמץ בפיקטורון. בזוויל נמצא שהזנים המתאימים דורשים המשך טיפול – הקיית עמידיות והקניית אחידות. חזן קרדינל אחדיך ויפה אך לפי התוצאות בגידול במו"פ דרום, יש יתרון בהמשך פיתוח זן בעל עלים קטנים יותר. התוצאות בפיקטורון מראות על אפשרות של בקרת הפריחה וההתפתחות של מינים שונים. לפי התוצאות ב מבחני חי האגרטל לאחר סימולציה שלוח אובי, רוזמרין ובזוויל אינם מהווים בעייה. המגבלה בזוויל היא טמפרטורת אחסון של 12 מ"ץ. באחרים עדין נדרש אופטימיזציה לשיפור החשתמרות. בוטיבר קיימת בעיה של הצבתה העלים, שתלויה מאוד באופן הטיפול בתוצאת לאחר הקטיף: בניסוי הנוכחי הצמחי הועברו לבית דגן לאחר שנקטפו שעות קודם לכך, ויש לבחון קורר מיידי ו/או טיפולים מקובלים לפתרון הבעיה. מעניין, שבמשלותי הניסיון להולנד לא היה דיווח בעיות השתמרות. לגבי האכילהה, מדובר על זן יהודי שבזון הזה אורך גבעולי התפרחות הוא רק 40-50 ס"מ. לפי התוצאות, צירות יותר. קיימת בעיה שבזון הזה אורך גבעולי התפרחות הוא רק 40-50 ס"מ. לפי התוצאות, גבעול פריחה באורך המתאים מתקבל בתנאי טמפרטורה נמוכה. יש לבחון טיפול ורנלייזציה לשתיילים. הפריחה התקבלה בתנאי יום ארוך. הממצאים מובילים לבחינת הגידול בתנאי שדה פתוח או בית רשות עם תוספת האורת לילה בחווף. במרווה הרפואית נחמן זן המכלא "כללית 1", לפי התוצאות ניתן לאחסן ללא בעיה ענפים לא פורחים, אך יש למצוא פתרון לאחסן ענפים נושא תפרחת.

בחינת רוזמרין עולה, שהוא מין אידיאלי לענף קטיף. ברשותנו אוסף של 25 טיפוסי רוזמרין, חלקם זקנים ובכלי צורה יהודית. יש לבחון התאמתם של הטיפוסים השונים לשוק הענפים הרפואיים. גם במרווה רפואי נבחן זן אחד ויתכן שיש לבחון טיפוסים נוספים מותך המבחן בנווה עיר. לגבי הגת, לאור הביקוש הרב שנוצר לאחרונה בענפים לעיטה, ניתן שניתן בשלב גידול דו תכליתי לשתי המטרות. בעוד המשך מחקר הנוכחי יש לעיר תוצאות נוספות במו"פים ובמשקי מודל בהיקף חי מסחרי. בנוסף, יש להמשיך לחפש מינים מתאימים, למשל זני אורגנו ולענות, פרחי עירית ועוד.

סיכום עם שאלות מנהחות

- מטרות המחקר לתקופת הדוי"ח תוך התייחסות לתכנית העבודה. איתור צמחי תבלין המתאימים לבחינה ליישום כפרחין/ענפי קטיף, ריבוי ראשוןי ובחינותם ב皮יטוטרין לדרישות הפריחה ותגובהם לגורמי סביבה, בחינת חי האגרטל.
- עיקרי הניסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדוי"ח המינים שנמנחו: טיפוסי בזיל, רוזמרין, אכלאה, מכלוא של מרווה רפואי, וטיבר, קאת נאכלת. נערך ריבוי ראשוןי ונשתלו חלקות לציפוי וחלקות אם. נערך ניסוי ב皮יטוטרין. נשלחו משלוחי ניסיון של פרחין וענפי וטיבר. נערך ניסויים ראשוניים לבחינת חי האגרטל.
- הمسקנות המדעיות וההשלכות לגבי המשך המחקר
 - רוב המינים שנבררו הם רב שנתיים, אינם מתאימים לגידול בחממה, ונראה שיש לגדים בבית רשות. בחלק מהם נתקלנו בעיות בריבוי, שכן יש להשיקע מאיץ ב皮יטוטרין. בזיל נמצא שזהנים מתאימים לגידול אם כי יש מקום להמשך טיפוח – הקנית עמידיות, אחידות והקטנת העלים. התצפיות ב皮יטוטרין מראות על אפשרות של בקרת הפריחה וההתפתחות של מינים שונים. בבחינת חי האגרטל אותו הבעיות ספציפיות למינים השונים.
- הבעיות שנותרו לפתרון ואו השינויים במהלך העבודה.
 - יש להמשיך לחפש מינים מתאימים, למשל זני אורגנו ולענה, פרחי עירית ועוד. יש לעורוץ גידול ותצפיות בשטח חצי מסחרי. יש להמשיך בניסיונות הסימולציה למשLOWות וחיי האגרטל ופיתוח פרוטוקול ייחודי לכל גידול.
- האם כבר הוחל בהפצת הידע שנוצר בתחילת הדוי"ח
 - החל גידול משקי של וטיבר ורוזמרין לבחינת הפוטנציאל. ניתנו הרצאות דיווח לוועדת ההיגוי של המו"פ.
- פרסום הדוי"ח:
- לא הגבלה.