



בחיינת תכשירים להדברת כנימת על האפרסק בפלפל בבית צמיחה

ניצן כהן, נטע מזור, סבטלנה דוברינין, שי דניאל – תחום הגנות הצומח, שה"מ; דוד סילברמן, חאלד עומר – תחום ירקות, שה"מ; מוראד גנאמ, סבטלנה קונגצ'לב – מכון וולקני; מתן גור אריה – אדמה מכתשים; אבידע אלון, ישראל סוסנובייך – לוכסמבורג; ליאור ישראלי – ליזור; חמזה עומר – תרסיס

הערה התנצלות:

אנו מפרסמים מאמר זה בשנית וזאת שיבושים שנפלו בגרפים במאמר לפני חודש

למושב נתיב הגדור, בפלפל מזון "קרנף" שנשתל בתאריך 15/8/2021. חלקה זו נבחנה בשל נגיעות בינוונית ואחדיה בכנימת עלה האפרסק (ייתכן שמדובר בתת-המין ניקוטיאנה) ובשל נוכחות דלה מאוד של צראעות טפיליות, שהימצאותן בשטח עלולה להטotta את תוכאות הניסוי. הניסוי, כלל 7 טיפולים, הוכח במתכונת של בלוקים באקראי ב-5 חזרות (טבלה 1). כל חזרה כללה ערוגה באורך 4 מטרים (2 שורות שתלים בערוגה). בתאריך 12/5/2022 בוצע ריסוס אחד על ידי רסס אחד באמצעות מרסס גב מפוח מדגם STIHIL SR-420 במצב פתיחה 4, בנפח תרסיס של 100 ליטר/دونם.

הערכת נגיעות נעשתה על ידי סימון 10 קודקודי צמיחה נגועים בכל חזרה, בגובה שליש הצמח העליון עם סרט סימון (5 בכל שורה משנה כדי הערוגה). בכל קודקוד צמיחה נבחר העלה הראשונית הבוגרת שהתיישר, ומצדו העליון נספרו כנימות העלה מכל דרגות הנימפות והבוגרות, על הופעתיהן (מכונפות וחסרות כנפים), כך שבכל הערכה נספרו בסך הכל 50 עלים מכל טיפול. הערכות נעשו ביום הריסוס, מיד לפני התחלתנו (ספירת 0), ובשלשה מועדים לאחר הריסוס: 15/5/2022 (3 ימים מהרישוס), 19/5/2022 (שבוע מהרישוס) ו-26/5/2022 (שבועיים מהרישוס). ניתוח סטטיסטי של תוכאות הניסוי נעשה בתוכנת jmp בשיטת tukey ברמת מובהקות 0.05.

טבלה 1: רשימת הטיפולים שנבדקו בניסוי בבקעת הירדן

מבוא
כニימות עלה הבעה חמורה במגוון נרחב של גידולים, ובכלל מהמקרים יש קושי בהדברתן. נזקן מתבטא במצבה ישירה של מוהל הצמח, בהפרשת טל דבש, שהוא נזול סוכר היוצר תנאים להתקפות פטריות "פייחת", ובהתוון וקטור להעברת וירוסים בכמה גידולים. נזקונות גורמת לקיפול עלים, לעצירת הגדלול, לפגיעה באיכותו, לפרי שマーואה אינו אסתטי וללכלוך התוצרת (תמונה 1-3). גידול הפלפל נגע לחוב בכנימת עלה הדלועים (Aphis gossypii) ובכנימת עלה האפרסק (Myzus persicae), ומעת לעת מופיע בגידולים מין של כנימת עלה האפרסק: כנימת עלה האפרסק ניקוטיאנה (M. persicae spp.) או כנימת עלה האפרסק nicotianae (Tobacco aphid:aphid), בשל יכולתה לגדול על צמח הטבק. כニימות מותת-מין זה עמידות לתוכشيرים מקבוצת הניאוניקוטינואדים (כגון קונפידור, מוספילון ועוד) והן אובחנו עד כה בשדה בצדע הוורדדר (תמונה 4), אך בתנאים מסוימים גם כנימת עלה האפרסק יכולה להופיע בגוני ורוד. יתרה מזאת, תת-המין ניקוטיאנה אינה ניתנת תמיד ליזיה מדויק בבדיקה גנטית במעבדה, משום ש מבחינת הרצף הגנטי היא זהה לבנייה בכנימת עלה האפרסק. מטרת ניסוי זה היא לבחון את עילותם של תוכשירים שונים נגד המזיק, בהשוואה להיקש לא מטופל.

חומרים ו.metod

הניסוי נערך בבית צמיחה שגודלו כ-10 دونם, הסמוך




בسمוך למושב נתיב הגזוז, כולל פירוט הריכוז/מינון לדונג של התכשירים, החומר הפעיל והקובוצה למניעת עמידות (לפי מין של ארגון IRAC) ושם החברה המשווקת

| טיפול | ריכוז/מינון לדונג | חומר פעיל | קבוצת פעילות IRAC לפי | חברה משווקת |
|------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| מובנטו + שמן jms | 1% 50 סמ"ק + | SPIROTETRAMAT + DISTILATES (PETROLEUM) HYDROTREATED LIGHT AND HEAVY PARAFFINIC | 23 | לידור |
| טיפיקי + שטח 90 | 0.1% 15 גרם + | FLONICAMID + ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE | 29 | LOCOSMBOORG + אדמה מכתשים |
| ורסיס | 20 סמ"ק | AFIDOPYROPEN | 9D | LOCOSMBOORG אדמה מכתשים |
| אומי | 100 סמ"ק | TOLFENPYRAD | A21 | אדמה מכתשים |
| אצטאסטאר | 250 גרם | ACETAMIPRID + BIFENTHRIN | 4A+3A | הנימות לעלה |
| פלаш + שטח 90 | 0.1% 30 סמ"ק + | SULFOXAFLOR + ALKYL PHENOLETHYLENE OXIDE CONDENSATE | C4 | טרסיס |
| לא טיפול | | | | להיקש |

להיקש, למעט הטיפול באצטאסטאר. בטיפול זה אוכליוסית כנימות העלה המשיכה לעלות, והוא לא נבדל מההיקש (איור 2). יש לציין כי התכשיר ורסיס בלט לטובה והפחית את כמות הכנימות לפחות מפחתות משתתי כנימות במומוצע לעלה.


תוצאות

הערכת הנגיעות בספירת אפס שנערכה לפני הריסום, הראתה כי אין הבדל מובהק ברמת הנגיעות ההתחלתית בטיפולים השונים (איור 1), כשהממוצע שנספר היה 37.4 כנימות לעלה.



איור 2: מספר הכנימות הממוצע לעלה בכל טיפול שלושה ימים ממועד הריסום, בתאריך 15/5/2022 [אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05]

תוצתת ספירת כנימות העלה כעבור שבוע ממועד הריסום מופיעה באיור 3. בדומה ל佗צאות שהתקבלו לאחר שלושה ימים, למעט אצטאסטאר, כל התכשירים שנבדקו הובילו לירידה מובהקת במספר הכנימות הממוצע לעלה בהשוואה להיקש (איור 3), במקביל לירידה מסוימת במספר הכנימות לעלה שנספרו בהיקש ובטיפול באצטאסטאר מאז הספירה הקודמת



איור 1: מספר הכנימות הממוצע לעלה בכל טיפול, בספירת האפס שנערכה לפני הריסום בתאריך 2/2/2022. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בין הטיפולים

תוצתת ספירת כנימות העלה לאחר שלושה ימים ממועד הריסום מופיעה באיור 2. ניתן לראות שככל התכשירים הפחתו באופן מובהק את רמת אוכליוסיות כנימות העלה בהשוואה




סיכום

התמודדות עם כנימות עלה האפרסק יכולה להיות קשה, ועוד יותר מכך - מסובכת ההתמודדות עם תחתה - הניקוטינאנה. אף שיש חשיבות רבה לזרחי המין שלו - הניקוטינאנה. נcano של המזוקן לצורכי הפעלת אמצעי הדבירה מתאימים, לא ניתן להגיע להבוחן בודאות בין השתיים. שנת 2022 התאפיינה בנגיעות גבוהות בכニימות עלה בכמה גידולים, ונראו התפרצויות חמורות שלחן בגידול הפלפל בבקעת הירדן ובאזורים אחרים בארץ. בהתמודדות עם כニימות הירדן באזורי אגוטכניםים, כימיים וביולוגיים. בניסוי זה, שנערך לצורך בחינת השפעת תכשירים על כנימת עלה האפרסק בפלפל, שנשתל בחודש אוגוסט באזורי הבקעה, נמצא שהתכשירים: לאומי, פלאש בשילוב שטח 90, טיפיקי בשילוב שטח 90, מובנטו בשילוב שמן JMS ורסיס - הפחיתו את אוכולוסית כニימות העלה על גבי העלים כבר לאחר שלושה ימים מריסוס, כאשר התכשיר ורסיס בלט לטובה. התכשיר מקבוצת הניאוניקוטינואידים וחוסר עילותו בהדברת האפרסק. התכשיר אצטאסטאר מכיל בתוכו חומר מקבוצת הימיקוטינואידים וחותר עילותו בהדברת האפרסק.




תמונה 1-3: נזקי כニימות עלה בחלקות פלפל סתווי בבקעת הירדן (צילום: נ. מהן)

שנעשתה ארבעה ימים קודם לכן בתאריך 5/15. עם זאת, לא נמצא הבדל מובהק בין ארבעת הטיפולים: אצטאסטאר, פלאש בשילוב שטח 90, טיפיקי בשילוב שטח 90 ולאומי. בספירה זו בלטו לטובה התכשירים ורסיס ומובנטו בשילוב שמן JMS, שהובילו לירידה בכニימות והםוצע של פחות משלוש כニימות לעלה.



איור 3: מספר הכニימות המומוצע לעלה בכל טיפול בעבר שבועיים ממועד הריסוס, בתאריך 19/5/2022 [אותיות שונות מציניות הבדלים ברמת מובהקות 0.05]

תוצאת ספירת כニימות העלה לאחר שבועיים ממועד הריסוס מופיעות באיור 4. בספירה זו בלטו לטובה שוב התכשירים ורסיס ומובנטו בשילוב שמן JMS (איור 4). שאר התכשירים אינם שונים במובהק זה זה, אך רק הטיפול בטיפיקי בשילוב שטח 90 נמור במובהק מההיקש ואינו נבדל במובהק מטיפולי המובנטו והרסיס.



איור 4: מספר הכニימות המומוצע לעלה בכל טיפול בעבר שבועיים ממועד הריסוס, בתאריך 26/5/2022 [אותיות שונות מציניות הבדלים ברמת מובהקות 0.05]



הטבק בלבד במנון של 50-75 סמ"ק לדונם, ובחלבי רישוי נגד כנימות עליה במנון של 20 סמ"ק לדונם.

הבעת תודה

תוודנו נתונה למגדל דניאל קוסטן ממושב יטב על הקצאת החלקה ועל שיתוף הפעולה המלא במהלך תקופת הניסוי. האמור לעיל הינו בגדיר עצה מקצועית בלבד והוא מוהוה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפט. על מקבל העצה להציג מנגד זירות, ושים שואו הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות בלבד. אין להעתיק, להפיצו או לשימוש מסמך זה או בחוקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב של החתוםים.



תמונה 4: כנימת עליה הניקוטיאנה בעקבים שונים, כלל וזרד, בחלקת פלפל בערבה (צלום: ס. דוברניין)

בדלו טיפולים אלה במובהק מההיקש, כאשר בלטו לטובה התכשירים מובנטו בשילוב שמן SJS וורסיס, ובשלב זה נצפו בהם בעיקר כנימות עליה בוגרות מכונפות. בספירה שבוצעה בעבר שביעיים מהרישוס, ניתן לראות שתיפול במובנטו בשילוב שמן SJS והטיפול בורסיס בלטו לטובה שוב, אך גם בטיפול בטיפיקי בשילוב שטח 90 התמעטה אוכלוסייתן של כנימות העלה ביחס ליתר הטיפולים, שלא נבדלו במובהק מההיקש. התכשירים שנוסו בניסוי זה בבקעת הירדן כנגד כנימת עליה האפרסק מושכים לשימוש בפלפל. חשוב לציין כי התכשיר ורסיס קיבל לאחרונה רישוי בפלפל כנגד כנימת עש



איקון

קוטל חרקים סיסטמי לשימוש במטעים, גפן, גד"ש, ירקות ותבלינים, להדברת ציקדות וכנימת עש הטבק

מיכל: 1/ g 200 Dinotefuran

מורשה בשקד, אפרסק ונектרינה להדברת ציקדה יrokeha
מורשה בעגבניה, חציל, קישוא, פלפל וכורוב להדברת

כנימת עש הטבק

תפוזול
תעשיות כימיות

www.tapazol.co.il