

שק, גידולו וטיפולו

הבליה"ד סילווייה גלפט-רייך

מופייעים עוד בפריחה, ומופיעים דורות אחדים, בעיקר בפירות המבוגרים מוקדם. לשכנותם עם מטעים אחרים יש השפעה רבה: בקרבת פרדסים מופיעה הכנימה הפלורידית, ומטעי אפרסמן — כנימת העש הלבנה. כנימות עללה מופיעות במטעים הצעירים. יש להשתמש בחמירים הגורמים ורק הפרה מעטה של שיווירה המשקל הבוגורי. סס הנמר מופיע בשכנות למטעי אגסים או תפוחים. הטיפול הנitinן הוא ידני. גם מחלת הגרב עלולה לפגוע במטעי שיק. מחלות הבוטרייטיס והגרב מופיעות בין ינואר ומרס, בעיקר באורות לחום. חרכון התגללה,

במידה מצומצמת, במטעי שיק בגיל העליון ובנגב. בדינום הדוגשה החשיבות של יצוא השק, שכן רק הייצוא יוכל לאוזן את מחירי השוק הפנימי של פרי זה בתקופת הבשלתו הקצרה. לכן נערך, בחודש אפריל שנה זו, סיור של היחידה לחקר שוקים ואנשי ארגון מגדרי פירות בשוקי אירופה, כדי להתרשם מഫוטנציאל שיק השק בחו"ל ומדרישות השוק. המסירים ביקרו באיטליה, בגרמניה ובצרפת. המייבאות ומשווקות השק ובאחד מאוזורי ספרד, איזור עיקרי של גידול השק. הם הוציאו לאור חוברת, המסתמכת סיור זה. במשך 10 שנים האחרונות הגדילה ספרד את יצוא השק; בשנה האחרונה הוא הגיע ל-14,000 טונה, והנטעה נמשכת. ספרד היא הספקית העיקרית של השק לאירופה, ואיטליה — היבואנית הגדולה. יבוא השק לאירופה נמשך במשך אפריל עד סוף אמצע מי, ומגיע לכדי 40,000 טונה בשנה. הספרדים מיצאים את השק מסוף אפריל עד סוף יוני. ב-1989 ייבאה איטליה כ-10,000 טונה השק מספרד. הפרי הספרדי נשלח באריזות עצ' של 9 ק"ג; הוא א Rozzo בשתי שכבות, כשרירית ספוג מפרידה ביןיהן. הפרי המוצע מאיטליה הוא בגודל 40 ומעלה. צרפת ייבאה ב-1989 כ-1000 טונה. צורכת את הפרי בעיקר האוכלוסייה המcarine את הפרי ממוקם מוצאה. מחברו, שבחדשים אפריל-מאי כמעט אין השק בשוקי חוויל; ספרד מגיעה עם הפרי רק בסוף מי.

לפני שנה נשלחו מהארץ 9 טונות השק. השנה, המחיר הממוצע של הפרי היה 1970 דולר פ"ב הטונה. ההוצאות בארץ לטונה היו 300 — 350 דולר. הפרי נארו ב"נספקים" של חצי ק"ג; הוא היה בעל איכות טيبة, ויפה מהפרי האיטלקי והספרדי. הגermeninos מוכנים, כפי הנראה, לשלם בהתאם למראה הפרי ואירועו; אולם הכמות היו קטנות מאוד.

יתכן שיש מקום לייצא גם השק "אורגני". להלן — מעט פרטים על מטעי השק בספרד. הון העיקרי הוא "אלגריאן" (כ-80%). פריו גדול, כתרו עד 60 מ"מ. אין חדש הוא "פלוציה". פריו גדול ואפיל, בעל ציפה לבנה, אין לוoka ב"כתמי דם". הוא מבשיל באמצעות מי, בעל פרי גדורן מאור, 250 — 300 ג' , ומגיע גם ל-400 ג' ; אין פרי שמשקלו פחות מ-125 ג'. הפרי קלף, וטعمו מתוק. אין נסוך הוא "טנקה" שנוטעים אותו בשכנותם עם הון "גנט" (שם הפריה). מטעי השק הם בהשקייה בטפטוף או בהצפה. רוחוי נטיעת 3 על 3 מ'. רשותה היחסית מתחומות על עמודי עץ. הפרי נאזר בשטח ארגזי עץ או בקרטונים, בשתי שכבות, כשבוקץ הפרי כפוי מטה ובין שכבות ספוג. המגדל שולח את הפרי הארוח לבית-אריזה. סוגים ב' וג' נשלחים בצוובר.

בסוף יוני ערך יוס-יעון למגדל שיק. להלן נביא את עיקר הבעיות, הקשורות עם גידול וייצואו של פרי זה, כפי שהציגו את המרצים.

באرض נתועים כ-3000 דונם שיק, והיבול מגע ל-2500 טונה בשנה. חלק מהმטעים — בשטח גלי, וחילקו מכוסה רשות או גודל חממות. השק מבשיל מוקדם בעונה: באביב האחרון הבשיל הפרי בחממות מבשיל בתחילת מרס. זה היה הפרי הראשון הראשן בעונה, ושלושה שבועות מחריו היו גבויים, בין 8 ל-18 שקל הק"ג. הפרי היה גדול יחסית ונקי מכתמים, ונעה לדידיות השוק. אך השטח הנטו הוא גדול. וקיים חשש מפני קשיים בשיווק המקומי בעקביד הקרוב. לכן, המטרה צריכה להיות — לשפר את טיב הפרי ואת מראתו, גם לשיק מקומי וגם לייצוא, ולהשיג פרי גדול ונקי מ"כתמי דם" ו"חולודה"; יש להגבר את דילול הפרי ולהאריך את עונתו — גם על ידי הרחבת הנטעה לאזורי נספסים המתאימים לגידול זה וגם על ידי כיסוי המטע. כיסוי פלסטיק, למשל, גורם הקדמת הבשלה, אבל גם הקטנת הפרי. כל המרצים הדגישו את חשיבות גודל הפרי (הכרה בדילול) ואת נזונו דבר שקרה להשגו בשטח גלי. ביום 8 עד 70 ד' חממות של השק, בחממות הפרי יתרה יפה.

אבל אין מגע לפחות הרצוי, ומתקבל יבול פחות. בדור-יכלול לא כדאי לכופף את ענפי העץ הארוכים. אלא יש לגוזם חלק מהם, וחלק להשאר להצללה. המטרה היא — להקטין את העץ, כדי להימנע מקטיפה בעמידה על סולמות. יש צורך בדילול הפרי 2-3 פעמים, ולהתחליל כשבודל הפרי כזות. עדין לא ברור מתי העונה המתאימה ביותר לדילולם. בכל אופן, מליצים להפסיק את הדילול בחודש לפני הקטיף, וכחודש לאחר הקטיף רצוי לדשן. הפרי גיש מאד ונותה לקבל כתמים. וכך רצוי לנגע בו מעט ככל האפשר. לכן גם יש לקטוף ישר לסללה, ולסדר את הסלסלות בקרטוניים.

אחד הפגמים הפיזיולוגיים של הפרי הם הכתמים האדומים. הקורויים "כתמי דם" ומכוירים את מראה הפרי. עד כה לא נמצא את גורם התופעה. בסקר שנערך בכת-שלמה נמצא כי בעצים לא מוצלים הגעה ל-30%, ובעצים מוצלים היא הינה הרבה יותר קטנה. ד"ר בני אבידן מרכז וולקני עורך ניסויים ומחקר, כדי למצוא את סיבת התופעה ודרךים למניעתה. בניסויים של כסויו הפרי בעטיפות שונות הונמקה הטמפרטורה סביבה הפרי וחותעת כתמי הדם אמנים הופחתה, אבל ככל זאת הופיע הנזק באחיזות גדולות למדוי. כן נערכו בדיקות של ח谋רים הורמוניים שונים כגון ציטוקינינים, אוכסינים, פרומליני, GAs ו-GA₄, כסיבות אפשריות לתופעה: אך השונות בין התוצאות היהת רבה, ועדין אי אפשר להגיד למסkont. נבדקו גם המינרלי של הפרי ועוד, ולפי שעיה לא תוצאות. הבדיקות, בכיוונים שונים, נשכחות.

מיוקים ובאים עלולים לפגוע במטעי השק: בנייתם ובובים ים-התיכון (לגביו דרושה הדבירה אוזורית), עש קליפת הדר, עש האשכל. אלה